


20. **Acheilognathus macrodorsalis* nov. sp.

DESCRIPTION DU TYPE.

Le corps est comprimé et fusiforme, sa hauteur est comprise 3 fois dans la longueur sans la caudale, la longueur de la tête, 3 fois $4/5$. Le diamètre de l'œil inférieur à la longueur du museau ainsi qu'à la largeur du corps est contenue 4 fois dans la tête. La bouche est inférieure, sans barbillons et s'étend à peine jusque sous la narine. Les dents pharyngiennes d'un paratype sont disposées en une seule rangées ($5/5$). La ligne latérale est complète, il se compose 35 écailles, 5 entre la ligne latérale et le dos, 4 entre la ligne et le ventre. La dorsale est formée de 2 rayons simples non épineux, et de 10 rayons branchus, les rayons en arrière sont les plus longs, et le plus long des rayons est $1/10$ plus long que la tête; la nageoire débute à égale distance du museau et de l'origine caudale. L'anale est composée de 2 rayons simples non épineux et de 10 rayons branchus, sa longueur est contenue 1 fois $2/5$ dans le tête. La



Acheilognathus macrodorsalis nov. sp. $\times 2$ type.

pectorale atteint $4/5$ de la distance à l'origine de la ventrale. Celle-ci commence un peu avant l'anale. La hauteur de la pedicule caudale est contenue 2 fois $1/5$.

La coloration est grisâtre en dessus et jaunâtre en dessous, elle est noir sur le dos, sur la face dorsale de la tête et au ventre après l'origine de la pectorale. La bande "Rhodein" est longue, large et noire foncée, atteignant au dessus de la portion centrale de la pectorale. Il y a une grande tache noire au dessus de l'aisselle operculaire. Toutes les nageoire sauf les pectorales et

la caudale qui sont plus pâles sont noires grisâtres. L'anale et la ventrale sont ornées chacune d'une marge blanche.

D. II, 10; A. II, 10; P. I, 10; V. I, 6; Sq. 35, 5/4.

LOCALITÉ: Sitientou, Ansin. NOM LOCAL : Shih Pau (石包).

Ce poisson se distingue de toutes les autres espèces de ce genre par sa grande dorsale, d'où vient le nom d'espèce. La coloration noire des nageoires et les marges blanches de l'anale et de la ventrale sont aussi bien caractéristiques.

MENSURATIONS DU TYPE ET DES PARATYPES:

Localité	Longueur sans la caudale mm.	Hauteur		Tête		Œil		Dorsale	Anale	Écailles
		mm.	dans la longueur	mm.	dans la longueur	mm.	dans la tête			
Sitientou (type)	48,0	16,2	3,0	12,5	3,8	3,1	4,0	II, 10	II, 10	35, 4/5
Sitientou	51,5	17,1	3,0	12,4	4,2	4,0	3,1	II, 10	II, 10	37, 5½/4
Sitientou	45,8	15,8	2,9	11,2	4,1	3,8	3,0	II, 10	II, 10	36, 6/4
Chaopeikou	41,2	12,9	3,2	10,8	3,8	3,5	3,0	II, 10	II, 10	35, 6/4
Sin-an	48,2	15,7	3,1	12,1	4,0	4,0	3,0	II, 10	II, 10	35, 5½/4
Sitientou	48,3	16,9	2,9	12,2	4,0	3,8	3,2	II, 10	II, 10	35, 5½/4½
Sitientou	45,2	16,0	2,8	12,1	3,7	3,8	3,2	II, 10	II, 10	35, 5½/4

21. *Acanthorhodeus atranalis* Günther. Un seul exemplaire de Tien de l'Ouest récolté au 21 juin 1930.

22. *Abbottina rivularis* (Basilewsky) 獨冠頭. Wen-an Wa.

COBITIDÆ

23. *Cobitis taenia* Linnaeus 花鰱. Sitientou.

24. *Misgurnus anguillicaudatus* (Cantor) 泥鰱. Shengfang et Wen-an Wa.

HEMIRAMPIDÆ

25. **Hemiramphus intermedius* Cantor 針魚. Koukochuang.