

Dyrzela tumidimacula: Holloway, 1976, Moths Borneo, p. 14. —Holloway, 1989, Malay. Nat. J. 42: 183.

翅展 31 mm。头部黄褐色，触角基节前缘黄白色，额下半部微白，下唇须第一、二节外侧黑色，第三节灰杂褐色；胸部背面褐色，颈板基部黄灰色，足外侧黑褐色；前翅红褐色，基线隐约可见，暗褐色，自前缘脉至亚中褶，有间断，内线不明显，黑褐色，微曲外斜，环纹不显，中线细，黑褐色，近呈直线内斜，肾纹只现微弱黑边，椭圆形，外线细弱，黑褐色，自前缘脉外斜至 6 脉，微曲内斜至亚中褶，折向外斜，亚端线不显，隐约可见零星黑点，外线前段外方有一大黑斑，约呈斗形，其后缘弧形，内、外侧衬以浅黄色纹，近翅外缘有一列黑点，其内侧均衬以黄白色，缘毛赤褐色，端部深棕色；后翅黑褐色，缘毛赭黄色；腹部灰褐色，背面各节间浅黄色。

分布 云南；马来西亚，印度尼西亚等。

甲线迪夜蛾 *Dyrzela squamata* Warren (图版 XXXVI-17)

Dyrzela squamata Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World, 11: 177, pl. 20b. (缅甸)

Elydna squamata: Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 273.

翅展 28 mm。头部暗褐色，下唇须前缘黄白色；胸部背面暗褐色，下胸黄白色，足跗节外侧暗褐色，各节间有白斑；前翅褐色，基线黑褐色，自前缘脉至中室后缘，两侧有黄白色细点，内线黑褐色，细波浪形，自前缘脉外斜至中室后缘，其后渐弱，线两侧密布黄白色细点，肾纹圆形，黄色黑边，外线黑褐色，细波浪形，自前缘脉外斜至 5 脉，其后渐弱，线两侧布有黄白色细点，亚端线黄白色，中段间断为点列，内侧有一列黑点，4—6 脉间为一斜方形黑斑；后翅淡褐色，外半部色较暗；腹部背面褐色。

分布 云南（勐仑）；缅甸。

齐夜蛾属 *Allocosmia* Sugi

Allocosmia Sugi, 1982, in Inoue, Moths Jap. 1: 776.

Type-species: *Dyrzela coreana* Matsumura.

喙发达，下唇须向上伸，复眼大，触角线形，胸部被鳞为主，胫节饰长毛，前翅有一副室，后翅 5 脉细弱。

沪齐夜蛾 *Allocosmia hoenei* (Bang-Haas) (图版 XXXVI-18)

Ipimorpha [sic] (*Plastenis*) *coreana* ssp. *hoenei* Bang-Haas, 1927, Hor. Macrolepid. p. 87, pl. 10, fig. 37. (上海)

Elydna coreana hoenei: Draudt, 1934, in Seitz, Macrolep. World 3 Suppl. p. 189.

翅展 35 mm 左右。头部及胸部淡黄灰色，下唇须第二节外侧有黑纹，前足胫节及

跗节外侧黑色，跗节有灰斑；前翅淡黄灰色，微带褐色，前缘 2/3 有一大深褐斑，基线微白，只达 1 脉，内线灰白，后半外斜，环纹长方形，灰白边，肾纹大，灰白边，外线灰白色，沿大斑内缘外斜至 5 脉折成一角，然后内弯，亚端线灰白，不明显，内侧有几个黑点，在亚中褶处黑点较大，端线为一列白点，外侧衬以白色；后翅淡褐黄色，端区较黑褐。

分布 江苏。

独夜蛾属 *Nikara* Moore

Nikara Moore, 1882, Lep. Atk. p. 126.

Type-species: *Nikara castanea* Moore.

Nicara Hampson, 1910, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 9: 183.

喙发达，下唇须短，向上伸，第二节较宽饰鳞，第三节小，额平滑，复眼圆大，雄蛾触角有细纤毛；胸部几全是鳞片，无毛簇，胫节外缘有长毛；腹部无毛簇；前翅稍短宽，顶角钝圆，外缘斜曲，不成锯齿形，有副室。

独夜蛾 *Nikara castanea* Moore (图版 XXXVI-19)

Nicara castanea Moore, 1882, Lep. Atk. p. 126, pl. 4, fig. 24. (印度)

Nikara castanea: Hampson, 1910, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 9: 183. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 273.

翅展 28 mm。头、胸及前翅暗棕色，前翅外线至翅外缘及亚中褶后方灰褐色，外区及顶角有铜褐色，内线不明显，暗褐色，自前缘脉外斜至中室后，亚中褶后不显，环纹只现蓝灰色边，窄长，极度外斜，肾纹只现不完整的蓝灰色边，外线黑棕色，自前缘脉外斜至 6 脉，外弯至 2 脉，与 2 脉基半部的黑棕色纵纹相合，外区前缘脉有一蓝灰斑，亚端线蓝灰色，两侧衬褐色；后翅灰棕色；腹部暗棕色。

分布 四川；锡金，印度。

兜夜蛾属 *Cosmia* Ochsenheimer

Cosmia Ochsenheimer, 1816, Schmett. Eur. 4: 84.

Type-species: *Phalaena diffinis* Linnaeus.

Calymnia Hübner, [1821] 1816, Verz. bek. Schmett. p. 235.

Eustegnia Hübner, [1821] 1816, Verz. bek. Schmett. p. 236.

喙发达，下唇须斜向上伸，第二节约达额中部，额平滑，复眼圆大，雄蛾触角较扁，有纤毛；胸部有毛及毛状鳞，无毛簇；腹部基部有粗毛，两侧有毛，无毛簇；前翅