

一小突似钩，近翅外缘有少许黑点，缘毛前半部有少许黑点，顶角处缘毛黑棕色；后翅白色，缘毛基部有一列黑点；腹部白色，第二节背面毛簇黄色。雌蛾前翅中区的银白斑边缘有黑色鳞。

分布 江西；马来西亚。

斑表夜蛾 *Titulcia confictella* Walker (图版 XXXVIII-16)

Titulcia confictella Walker, 1864, List Spec. Lep. Colln Br. Mus. 29: 811. (Sarawak)

Chionomera queusta Swinhoe, 1893, Ann. Mag. nat. Hist. 12: 259.

Titulcia confictella: Hampson, 1912, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 11: 484, pl. 186, fig. 27. —Gaede, 1937, in Seitz, Macrolep. World 11: 420. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 320.

翅展 21 mm。头部黄色；胸部背面银白色，下胸与足白色，前胸胫节及跗节黄色带褐色；前翅黄色带赤褐色，基部有一近三角形银白斑，自亚前缘脉至翅后缘，内外侧均衬以红棕色，中区有一银白斑，约呈斜方形，自前缘脉后至翅后缘，边缘微波浪形，其外缘在 5 脉处外凸近达翅外缘，其后内斜，斑的内、外缘及前缘均衬以红棕色，亚端区有一银白色小斑，自前缘脉后至 6 脉，其外缘波曲，四周围以红棕色波形形边；后翅白色；腹部白色，第二节背毛簇橘黄色。

分布 江西；新加坡，马来西亚。

爱丽夜蛾属 *Ariolica* Walker

Ariolica Walker, 1863 1864, J. Proc. Linn. Soc., Zool. 7: 53.

Type-species: *Ariolica lineolata* Walker.

Chionomera Butler, 1881, Trans. ent. Soc. p. 18.

喙发达，下唇须向上伸，第二节约达头顶，额平滑，复眼圆大，雄蛾触角有纤毛；胸部毛鳞混生，无毛簇；腹部基部两节有小毛簇；前翅顶角圆形，外缘斜曲，不成锯齿形，8、9、10 脉共柄，无副室。

中爱丽夜蛾 *Ariolica chinensis* Swinhoe (图版 XXXVIII-17)

Ariolica chinensis Swinhoe, 1902, Ann. Mag. nat. Hist. 7, 10: 49. (四川峨眉山)

Chionomera chinensis: Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 3: 295.

Ariolica chinensis: Hampson, 1912, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 11: 488, pl. 186, fig. 31. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 320. —Chen, 1992, in Peng, Icon. For. Ins. Hunan p. 991.

Ariolica (Pulchella) chinensis: Mell, 1943, Zool. Jb. (Syst.) 76: 214.

翅展 23—25 mm。头、胸、腹及前翅白色，后胸有一黄斑，前翅前缘黑棕色，翅基部一黄斑，内线黄色带状，两侧有细黑线，外线黄色带状，在 7 与 4 脉处各有一分支分别伸向顶角内侧及翅外缘，带的后端达臀角，内缘钝锯齿形，衬以粗黑线，端区有一黄色窄带，内缘衬黑色；后翅白色；腹部背面有浅褐条纹。

分布 湖南、四川。

蜡丽夜蛾属 *Kerala Moore*

Kerala Moore, 1881, Proc. zool. Soc. Lond. p. 329.

Type-species: *Kerala punctilineata Moore*.

Cerala Hampson, 1912, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 11: 489.

喙发达，下唇须向上伸，第二节约达头顶，额平滑，上缘有毛簇，复眼圆大，雄蛾触角有纤毛，两触角间有鳞脊；胸部鳞毛混生，后胸有散开的毛簇；腹部无毛簇；前翅稍窄长，顶角略呈长方形，外缘在中褶及臀角处微内削，不成锯齿形，有副室。

种 检 索 表

- | | |
|-----------------|----------------------------------|
| 1. 前翅密布暗点 | 2 |
| 前翅暗点稀疏 | 3 |
| 2. 前翅全带霉绿 | 蜡丽夜蛾 <i>Kerala punctilineata</i> |
| 前翅后半带霉绿 | 灰蜡丽夜蛾 <i>K. grisea</i> |
| 3. 前翅灰带霉绿 | 黑肾蜡丽夜蛾 <i>K. decipiens</i> |
| 前翅前半带紫色 | 繁蜡丽夜蛾 <i>K. multipunctata</i> |

黑肾蜡丽夜蛾 *Kerala decipiens* (Butler) (图版 XXXVIII - 18)

Cyana dicipiens Butler, 1879, Ann. Mag. nat. Hist. 5, 4: 352. (日本)

Cerala decipiens: Hampson, 1912, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 11: 491.

Kerala decipiens: Sugi, 1982, in Inoue et al., Moths Jap. 1: 798. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 320.

翅展 36—40 mm。头、胸灰色带浅褐色；前翅灰白带霉绿色，前半带紫褐色，各翅脉及前缘区有浅褐点列，内线褐色带状，后半分为二，肾纹黑色新月形，外线黑色微弱，亚端线黑色锯齿形，缘毛紫红杂白色；后翅污白，端区前半带褐色；腹部浅褐灰色。

分布 黑龙江、内蒙古、河南、湖南、四川；日本，俄罗斯。

繁蜡丽夜蛾 *Kerala multipunctata Moore* (图版 XXXVIII - 19)

Kerala multipunctata Moore, 1882, Lep. Atk. p. 93, pl. 4, fig. 4. (大吉岭)