

背面淡褐色，有小褐点，颈板褐色；前翅灰褐色，密布棕色细点，内线双线棕色，波浪形，在中室前稍外凸，其后微内斜，环纹只现一黑褐色点，肾纹只现二白点，均围以黑边，中线模糊，暗褐色，微波浪形，在中室后色较浓，外线双线棕色，波浪形，自前缘脉后外弯，在6、7脉处稍外突，2—5脉间外弯，其后内弯，亚端线双线黑棕色，线间黄色，在7脉处外凸，2—5脉间外弯，其后不清晰，在亚中褶处稍内凸，一暗褐内斜纹自顶角穿过亚端线，端区2—5脉间有一黑褐纹，翅外缘有一列黑点；后翅灰褐色，内线、中线及外线均与前翅相似，但不清晰，翅外缘有一列黑点；腹部黄褐色。

**寄主** 多花紫藤。

**分布** 黑龙江、江苏、浙江、湖南、福建；日本，朝鲜。

### 锉夜蛾 *Blasticorhinus rivulosa* (Walker) (图版 LXII-15)

*Thermesia rivulosa* Walker, 1865, List Spec. Ins. Colln Br. Mus. 33: 1060. (印度)

*Acantholipes quadripuncta* Swinhoe, 1902, Ann. Mag. nat. Hist. 7, 9: 423.

*Sanys rivulosa*: Moore, 1884—1887, Lep. Ceyl. 3: 205, pl. 174, fig. 5.

*Thermesia rivulosa*: Hampson, 1894, Fn. Br. Ind. 2: 536.

*Blasticorhinus rivulosa*: Sugi, 1982, in Inoue, Moths Jap. 1: 869, pl. 216. figs. 24—25.

翅展30 mm。头部与胸部灰褐色，下唇须、复眼后方及足外侧黑褐色杂少许灰色；前翅灰褐色，布有黑色细点，基线黑色波浪形，自前缘脉至1脉，内线双线黑色，波浪形，稍外斜，两线相距较宽，中线黑色，不明显，肾纹窄，黑边，外线细，黑色，自前缘脉外斜至6脉，其后强锯齿形后行，3脉后明显内弯并稍波曲，亚端线黑色，锯齿形，自7脉后内斜，线外方有一浅褐黄线，自顶角内斜，3脉后微弱，并呈锯齿形，翅脉纹稍黑，端区各翅脉间有浅褐色纵纹，端区色暗，缘毛基部有一褐黄细线；后翅灰褐色，内半带褐黄色，外半色暗，各横线黑色，不清晰；腹部暗灰褐色。

**分布** 四川；日本，印度，斯里兰卡。

### 宫夜蛾属 *Ecpatia* Turner

*Ecpatia* Turner, 1902, Proc. Linn. Soc. N. S. W. 27: 85.

Type-species: *Anophia dulcistriga* Walker.

喙发达，下唇须向上伸，第二节约达头顶，第三节细而短，雄蛾触角线形，有纤毛丛；胸部几乎全被毛，后胸有毛簇；前翅较短宽，有一副室；后翅中室长约为翅长之半，5脉发达，腹部背面有一列毛簇。

### 白斑宫夜蛾 *Ecpatia longinquua* (Swinhoe) (图版 LXII-16)

*Anophia longinquua* Swinhoe, 1890, Trans. ent. Soc. Lond. p. 233. (仰光)