

中国亚种与分布

(a) 利箭绢粉蝶西藏亚种 *Aporia harrietae baileyi* South, 1914 (图版 XI: 6)

Aporia harrietae baileyi South, 1914, J. Bombay Nat. Hist. Soc., 22(4): 599.

与云南亚种很相似，但翅面白斑较大，尤其是在翅外缘。

观察标本：西藏波密 2150m, 1♂, 1983.VII.9, 韩寅恒采。

分布：西藏。

(b) 利箭绢粉蝶云南亚种 *Aporia harrietae paracraea* (de Nicewill, 1900) (图版 XI: 7)

Metaporia paracraea de Nicewill, 1900, J. Bombay Nat. Hist. Soc. 13(1): 171, pl. EE, fig. 19.

Pieris albivena Oberthür, 1902, in Launay, Hist. Miss. Thibet 2: 411.

Pieris joubini Oberthür, 1913, Étud. Lép. Comp., 7: 670, pl. 187, fig. 1825. syn. nov.

Aporia harrietae paracraea (de Nicewill): Della Bruna et al., 2004: 57.

体型较指名亚种大，翅面黑色比例大于指名亚种，斑纹白色。前翅中室内的白斑端部为阴影状。后翅反面底色没有指名亚种那么黄。雄性外生殖器的爪形突末端明显呈双钩状；孔穴稍圆；阳茎很长，细而强烈弯曲；囊形突比爪形突长许多。

观察标本：云南腾冲半岷山 1760m, 1♀, 1979.V.19; 贡山东哨房, 2♂♂, 2002.VI.23, 黄灏采(存黄灏处)。

分布：云南(腾冲、德饮)。

(106) 蒙蓓绢粉蝶 *Aporia monbeigi* (Oberthür, 1917) (图 117)

Pieris monbeigi Oberthür, 1917, Étud. Lép. Comp., 14: 126, pl. 474, figs. 3908—3909.

Aporia monbeigi (Oberthür): Della Bruna et al., 2004: 58.

中等大小的种类。与利箭绢粉蝶云南亚种 *Aporia harrietae paracraea* (de Nicewill) 相似，但体型较小，翅正面的黑色比例较少。前翅顶角较圆，中室白斑较长、较窄(不占满中室宽度)，端部不像利箭绢粉蝶云南亚种那样有阴影， cu_2 室的白斑趋于分裂为 2 条； Cu_2 脉基部没有白边。后翅正面外缘的白斑较大，四边形；中室周围的翅脉白色，两侧有黑边；臀区几乎完全呈白色。后翅反面的底色深黄色。

雄性外生殖器爪形突末端明显呈双钩状；抱器瓣宽，孔穴很长；囊形突很短，短于爪形突的长度，侧面前端部呈球状；阳茎没有那么细弯。