

海南。

3. 雷山股枝蜥 *Paramyronides leishanensis* Bi, 新种 (图 1)

雌性：头长方形，略扁平，后头缺刺。触角丝状，其长超过前足股节。前胸背板为长




图 1 雷山股枝蜥 *Paramyronides leishanensis* Bi, 新种 ♀
1. 中胸背板； 2. 腹部末端侧视； 3. 腹部末端背视。

方形，具细颗粒，纵沟明显，横沟位于中部。中胸细长，较长于后胸，颗粒尤为明显。后胸略粗，中节略宽短。前、后翅均缺。前足股节具隆线，基部明显内凹，附节基节简单。中足

本文由夏凯龄教授审阅，徐仁娣同志绘图，特此一并致谢。

和后足股节腹侧中隆线顶端具一个三角形大齿(其上具数个小齿), 胫节略长于股节。后足不超出腹部末端。腹部第9节后缘具有明显的三角形凹入。腹瓣为舟形。尾须较短。

体色: 体为黄褐色。头和三足为黄绿色, 中足和后足股节下侧中隆线顶端齿为黑色。
体长 12 mm; 中胸背板 25 mm; 后胸背板(含中节) 20 mm; 前足股节 25.5 mm; 中足股节 20 mm; 后足股节 21 mm。

正模♀, 贵州雷山, 1988. VIII. 5, 刘祖尧采。

本新种与 *Paramyronides bootanicus* Westw. 相似, 但主要区别有以下几点: ①中胸背板具小颗粒。②腹部第9节后缘具明显而较深的三角形凹入。③腹瓣较短, 舟形。