

拟眼斑水龟 *Sacalia pseudocellata* Iverson et McCord

Sacalia pseudocellata Iverson and McCord, 1992, Proc. Biol. Soc. Wash., 105 (3): 426—432.

(模式标本产地: 中国海南东方县和感城县)

鉴别特征 中等大。头背光滑无鳞。头背侧有带黑边黄绿或橄榄绿斑块; 背甲具弱三棱; 腹甲大部分被黑色斑块覆盖; 具一长而窄的喉盾; 胸盾缝最长, 肱盾缝最短。

形态描述 依据原始描述。背甲长雄性 152 毫米, 雌性 176 毫米。背甲具弱三棱。头窄, 上颚无钩曲; 咀嚼面窄而无嵴; 颚背面到口角和鼓膜前具细小的疣粒。颈盾小, 呈长条形; 后缘无或弱锯齿形。腹甲短于背甲, 背、腹甲以甲桥相接, 每侧有一单枚小的腋盾和胯盾; 前部略上翘, 后缘肛盾有一弱凹缺; 胸盾缝 $\geq$ 腹盾缝 $>$ 肛盾缝 $>$ 喉盾缝 $>$ 股盾缝 $>$ 肱盾缝, 肛盾缝明显而完整。前肢的前表面有大的覆瓦状排列的鳞片, 3—4 枚最大的呈月牙状; 后肢跟鳞片大; 四肢和尾背覆以细鳞。雄性尾较雌性大而粗壮。

头背侧有黑边纵向的黄色到橄榄绿色斑块, 但沿颈到基部连续有黑边间隔和条纹; 有 2 个明显的漏斗状或不规则的眼斑; 颈背深褐色到黑色, 有带黑边的桔红色或桔黄色纵纹; 颈部及颈腹面黄色, 有模糊的斑点。背甲黑褐色到红褐色, 其前半部有细小的黑斑和条纹。腹甲黄色或桔黄色, 每一盾片大部分被黑色斑块覆盖; 每个缘盾边缘黄色; 甲桥边缘有纵行细长黑条纹。四肢暴露部分背、侧面为橄榄绿色, 腹面桔黄或桔红色。尾背暗橄榄褐色, 腹面桔红色。

地理分布 分布于海南 (东方、感城)。

四眼斑水龟 *Sacalia quadriocellata* (Siebenrock), 1903 (图 35, 图版 VII, 28)

Clemmys bealii quadriocellata Siebenrock, 1903, Sitzungsber. Kaiserl. Akad. Wiss. Wien, 112

(1): 336. (模式标本产地: 越南)

Clemmys quadriocellata Pope, 1934, Amer. Mus. Novit, 733: 16.

Sacalia quadriocellata Pritchard, 1979, Encycloped. Turtles, Neptune, New Jersey, 190.

鉴别特征 头背光滑无鳞。头部及背甲无虫纹斑, 头后侧有 2 对眼斑。

形态描述 依据广西 6 雌 6 雄共 12 号标本描述。背甲长雄性 122—135 毫米, 雌性 130—134 毫米; 宽雄性 76/84—84/92 毫米, 雌性 73/85—85/95 毫米; 高雄性 42—51 毫米, 雌性 45—53 毫米; 头宽 16.5—21 毫米。头部光滑无鳞; 吻短而尖, 超出下颚, 垂直向下达喙缘; 头背后侧有 2 对明显的眼斑。背甲较扁平, 脊棱明显, 侧棱弱而不显; 颈盾窄长, 后缘宽于前缘; 椎盾 5 枚, 宽大于长, 第一枚椎盾五边形, 前宽后窄; 肋盾 4 对; 缘盾 11 对; 臀盾 1 对。腹甲平坦, 略短于背甲, 前端平截, 后缘略凹; 腹盾缝最长, 远长于喉、肱盾缝之和, 肱盾缝最短。甲桥平坦不显。四肢平扁, 前肢外侧有若干大鳞; 指、趾间全蹼, 爪尖细而侧扁。尾纤细。