

- 2A 眶上鳞5枚，吻端下陷 斑蜓蜥 *S. maculatus*
 2B 眶上鳞4枚，吻端不下陷 3
 3A 环体中段鳞26—28行，第IV趾趾下瓣11—13枚，前后肢贴体相向时彼此不超越；鼓膜下陷不深 墨脱蜓蜥 *S. courcyanus*
 3B 环体中段30行以上，第IV趾趾下瓣16—22枚，前后肢贴体相向时，彼此超越，鼓膜深陷 4
 4A 股后外侧有1团大鳞；背面灰棕色，体侧无明显黑色纵带 股鳞蜓蜥 *S. incognitus*
 4B 股后外侧没有1团大鳞；背面青铜色；体侧有明显的黑色纵带 铜蜓蜥 *S. indicus*

(148) 墨脱蜓蜥 *Sphenomorphus courcyanus* (Annandale, 1912)

Lygosoma courcyanum N. Annandale, 1912, Rec. Indian Mus., Calcutta, 8: 43. Type locality: Rotung and Upper Rotung Xizang (Tibet) Autonomous Region, China (in territory occupied by India); 1,300 feet (Rotung) and about 2,000 feet (Upper Rotung).

Sphenomorphus courcyanus: M. B. Mittleman, 1952, Smithsonian Misc. Coll., Washington, 117 (17): 23.

鉴别特征 耳孔近于眼径大，鼓膜下陷不深；前后肢贴体相向时彼此不超越，第4趾趾下瓣11—13枚。

形态 依据 Smith (1935) 描述。

头体长44mm，尾长57mm。

腋胯间的距离约为吻至前肢距离的1.5—2倍。吻短而钝；吻鳞突出，宽大于长，与额鼻鳞相接较宽；前额鳞彼此相接；额鳞长度短于额顶鳞与间顶鳞之和；顶鳞在间顶鳞之后相接；无颈鳞；眶上鳞4枚，大小几相等，第一、二枚与额鳞相接；上睫鳞8或9枚；颊鳞2枚，后枚为三角形，尖端向下；颞鳞2枚，较大，重叠排列；上唇鳞7枚，第五枚在眼的正下方，第六枚最长；耳孔近于眼径大，周围平滑；颞部下陷不深；体鳞平滑，背鳞和腹鳞几等大，略大于体侧鳞片；环体中段鳞26—28行，背中线鳞55—62；一对大型的肛前鳞；尾基粗壮。肢短，前后肢贴体相向时，彼此不超越，或仅相遇；第IV趾趾下瓣11—13枚；掌蹠部被扁平疣鳞。

背面褐色，具深色点斑；背侧的暗褐色纵线上缘，镶有一浅色纵纹；体侧散布有褐色斑点；腹面带白色。

地理分布 西藏墨脱南部。国外分布于印度（阿萨姆）。

(149) 股鳞蜓蜥 *Sphenomorphus incognitus* (Thompson, 1912)

Lygosoma incognita J. C. Thompson 1912, Herpetol. Notices [privately published] San Francisco, 2: 3. Type locality: Koshun (= Hengchun), Formosa (= Taiwan Prov.), China.

Sphenomorphus boulengeri J. VanDenburgh 1912, Adv. Diag. New Rept. Amphib. Loo Choo Is. Formosa [privately published], San Francisco: 6. Type locality: Koshun (= Hengchun), Formosa (=