

末端形成实心的永久性硬刺；当半阴茎处于收缩状态时，牵引长肌至少盘绕成二圈；雄性泄殖腔顶部有一对中空盲囊，可能相当于米勒氏管的残余，开口于泄殖腔内尿生殖管开口之后方。

营穴居生活，昼伏夜出，以蚂蚁、白蚁、土壤有机物为食；卵生。分布于大洋洲伊里安岛，所罗门群岛，非洲及亚洲东南部。我国产2种，检索如下：

钩盲蛇属 *Ramphotyphlops* 种的检索

鼻鳞全裂为2 钩盲蛇 *R. braminus*
鼻鳞不全裂 白头钩盲蛇 *R. albiceps*

(1) 白头钩盲蛇 *Ramphotyphlops albiceps* (Boulenger, 1898)

Typhlops albiceps Boulenger, 1898, Ann. Mag. Nat. Hist. London, 7, 1: 124. Type locality: Chantaboon, Siam.

Ramphotyphlops albiceps: Grandison, 1978, Ann. Naturhist. Mus. Wien, 81: 283.

鉴别特征 鼻鳞不全裂。

形态描述 依据文献记载香港2号标本的描述。

一般体全长100—150 mm，最大全长200 mm。

生活时身体棕黑色，背部较深，腹部较浅，头、颈、尾和肛部白色。

吻圆；鼻鳞不完全裂，前鼻鳞未达吻，后鼻鳞与第一、二上唇鳞相接；眼前鳞与眼鳞、后鼻鳞等大，眼鳞下缘切第三、四上唇鳞；眼小，明显可见，头部鳞片大于体鳞；体鳞环体一周20行；尾端细尖。

生物学资料 穴居生活。以白蚁、小型蠕虫和小型土壤有机物为食。

地理分布 香港。国外分布于缅甸，马来西亚，泰国。

(2) 钩盲蛇 *Ramphotyphlops braminus* (Daudin, 1803)

Eryx braminus Daudin, 1803, Hist. Nat. Rept., Paris, 7: 279. Type locality: Vizagapatam, India.

Ramphotyphlops braminus: Nussbaum, 1980, Herpetologica, Lawrence, 36: 215.

地方名 铁丝蛇、铁线蛇、地鳝（贵州、福建）。

鉴别特征 鼻鳞全裂为2。

描述依据标本 广西龙津12雌，贵州兴义、榕江5雌3幼，广东广州3雌，海南三亚4雄2幼，云南孟连、勐阿、勐养、河口9雌1雄，重庆及四川南充5雌，福建1雌。

形态描述 一般体全长100 mm，最大全长雌性(193.5+3.5) mm（贵州榕江）。

生活时身体黑褐色，背部较深，腹部较浅，具金属光泽，吻端、肛部及尾尖带白色。