

**(4) 伊犁亚种 *Meriones meridianus penicilliger* Heptner, 1933**

*Plassiomys meridianus penicilliger* Heptner, 1933. Zool. Säugeth., 8: 154 (模式产地 土库曼斯坦卡拉库姆沙漠).

*Meriones meridianus penicilliger*, Ellerman 等, 1951. Checklist of Palaearctic and India Mammals. 643; 马勇等, 1981. 1 (2): 184; 王思博等, 1983. 新疆啮齿动物志, 151; 马勇等, 1987. 新疆北部地区啮齿动物的分类和分布, 190—191.

背毛灰色较浓, 为较浅的沙灰棕色, 体型小于叶城或塔里木地区的子午沙鼠。尾长大于体长, 约为体长的110.9%。尾毛沙棕色, 毛束黑褐色, 毛稀而短。分布仅新疆的伊犁地区, 国外见于哈萨克斯坦巴尔喀什湖以南的地区。

**量衡度** (衡: g; 量: mm)

外形:

编号	性别	采集地	体重	体长	尾长	后足长	耳长
25603	♂	霍城	36	95	114	28	14
25604	♂	霍城	37	95	115	28	15
25608	♂	霍城	50	100	115	28	15
25609	♂	霍城	55	115	112	28	14
25610	♂	霍城	33	90	105	28	14
25611	♀	霍城	33	93	105	28	13
25612	♀	霍城	30	93	105	28	13
25605	♀	霍城	35	95	115	27	14
25606	♀	霍城	55	115	100	28	15
25607	♀	霍城	36	97	110	28	13

头骨:

编号	性别	采集地	颅全长	颅基长	鼻骨长	腭长	齿隙	颧宽	眶间宽	后头宽	听泡长	听泡宽	上颊齿列长	下颊齿列长
25611	♀	霍城	29.0	25.5	10.0	12.3	7.5	15.3	5.6	14.6	11.0	7.9	3.6	3.8
25612	♀	霍城	28.5	25.5	9.0	12.0	7.8	16.4	5.2	14.6	10.7	7.8	3.7	3.7
25605	♀	霍城	30.9	26.7	10.5	12.8	7.9	16.7	5.5	14.8	11.8	8.3	3.7	3.8
25606	♀	霍城	32.8	29.0	11.3	13.7	8.3	17.5	5.5	15.2	12.0	8.2	3.9	4.0
25603	♂	霍城	31.3	26.7	10.9	13.3	7.8	16.7	5.5	16.1	11.5	8.2	3.8	3.9
25604	♂	霍城	31.8	27.9	11.0	13.5	8.1	16.2	5.6	15.2	11.9	8.0	3.7	3.8
25609	♂	霍城	32.8	29.0	13.2	14.2	8.5	18.0	6.0	15.8	12.1	9.2	4.1	4.3
25610	♂	霍城	29.9	26.1	9.8	12.2	7.6	—	5.4	14.2	11.2	—	3.8	3.8

**(5) 叶氏亚种 *Meriones meridianus jei* Wang, 1964**

*Merioner meridianus jei* Wang, 1964. 动物分类学报, 1: 11—12 (模式产地 新疆吐鲁番); 钱燕