


图62 大庸园蛛 *Araneus dayongensis*

a. 雌蛛外形 body (♀), b. 腹部腹面观 abdomen, ventral,
c—d. 外雌器 epigynum: c. 腹面观 ventral, d. 后背面观 posteriodorsal

妮园蛛 *Araneus nympha* (Simon, 1889) (图63)

Epeira nympha Simon, 1889 *J. Asiat. Soc. Bengal.* 58 (2, 4), Suppl.: 339 (♀)


Araneus nympha (Simon) — Dyal, 1935 *Bull. Zool. Punjab. Univ.* 1:182; Hu & Li, 1987b: 263, fig. 10

雌蛛体长4.00—4.60。全体呈褐色。8眼等大,前眼列后曲,后眼列微后曲,前、后中眼间距分别小于前、后中侧眼间距。中眼域长大于宽,前边大于后边。背甲长大于宽,周缘具褐色宽边,头区略隆起,颈沟明显,其内侧各有一弯月形白斑,并呈“X”形排列。中窝不明显,放射沟纹褐色。胸甲心形,黑褐色。螯肢黄褐色,前齿堤4齿,以第3齿最大,后齿堤3—4齿,最后一齿与前齿堤之第3齿并列。颚叶黑褐色,其内侧角黄白色,并具灰色毛丛。下唇宽大于长,黑褐色。触肢、步足黄褐色,各步足腿节远端黑褐色,膝、胫及后跗节有褐色环纹。腹部背面褐色,密布白色鳞斑及褐色网纹。正中有一条褐色纵行粗纹直达尾端,并有“人”字形分支向两侧伸出。在纵行纹的两侧有4枚椭圆形黑色肌痕。腹部腹面黄色。正中有一褐色宽纵带。纺器黑褐色。

多布网于灌木丛及杂草丛中。

观察标本: 仿胡金林对西藏(林芝、樟木、口岸、乃东)标本的记载、海拔2250—3800米,1984年8月6日,胡胜昌采;1985年7月15日,李爱华采;1981年,王保海采。

地理分布: 中国(西藏)、印度、巴基斯坦。


图63 妮园蛛 *Araneus nympa*

a. 雌蛛外形 body (♀), b—d. 外雌器 epigynum: b. 腹面观 ventral,
c. 背面观 dorsal, d. 侧面观 lateral (仿胡金林) (copied from Hu *et* Li, 1987)

八齿园蛛 *Araneus octodentalis* Song *et* Zhu, 1992 (图64)

Araneus octodentalis Song & Zhu, 1992 *J. Hubei Univ.* 14 (2): 169, fig. 5 (♂)

雄蛛体长4.30。头胸部长1.94, 宽1.77; 腹部长2.36, 宽1.94。两眼列均后曲, 第二

图64 八齿园蛛 *Araneus octodentalis*

a. 雄蛛外形 body (♂), b—c. 触肢器 palpal organ:
b. 前侧面观 prolateral, c. 腹正中观 mesal