

双室壮头蛛 *Chorizopes dicavus* Yin et al., 1990 (图132)

Chorizopes dicavus Yin et al., 1990 Spiders In China: 52, figs. 129–132 (♀)

雌蛛体长4.20。头胸部长1.85，宽1.50；腹部长2.50，宽1.85。前中眼稍大于后中眼，前中眼间距约等于前中眼直径，前中侧眼间距为前中眼直径的3.75倍；后中眼间距为前中眼直径之2倍，后中侧眼间距为5.25倍前中眼直径。中眼域梯形，前边小于后边，长小于宽。背甲赤褐色，头区及胸区前方极度隆起，渐向后倾斜。头区较胸区稍宽。后中眼之间两条黑褐色细纵纹至隆起部后缘。胸甲褐色，边缘黄褐色，螯肢赤褐色，前齿堤7齿，后齿堤无齿，螯肢前缘的前




图132 双室壮头蛛 *Chorizopes dicavus*

a—b. 雌蛛外形 body (♀): a. 背面观 dorsal, b. 侧面观 lateral,
c—d. 外雌器 epigynum: c. 腹面观 (离体) ventral, cleared,
d. 内部结构 vulva

部有一列长扁毛。颚叶、下唇黄褐色，步足纤细无刺，黄褐色有褐色纵条斑及环纹。腹部钟形，末端有4个赤褐色锥状突起，后面观呈菱形排列。背面黄褐色底，正中斑呈“土”字形由黑褐、黄褐色组成，前端两侧黑褐色，腹面黄褐色。正中有两条黑褐色细纵纹，两侧还有数条同色斜纹，腹后缘及后侧缘均为黑褐色。纺器黄褐色，其周缘褐色。外雌器的纳精囊分前、后两室，前室球形，后室扁椭圆形。交媾管粗短。

观察标本：1♀，湖南绥宁黄桑，1984年8月10日，王家福采。

地理分布：中国（湖南）。

飞雁壮头蛛 *Chorizopes goosus* Yin et al., 1990 (图133)

Chorizopes goosus Yin et al., 1990 Spiders In China: 53, figs. 133–136 (♀)

雌蛛体长3.80。头胸部长1.70，宽1.30；腹部长2.10，宽1.25。前中眼与后中眼近等大。前中眼间距稍大于前中眼直径，前中侧眼间距为前中眼直径的8倍；后中眼间距为前中眼直径的2.7倍，后中侧眼间距为后中眼直径的7倍。中眼域梯形，前边小于后边，长小于宽。背甲黑褐色，头区隆起，其高（厚）度不及其他壮头蛛。头区较胸区宽，后中眼间两条黑褐色细纵纹直达头区后缘。胸区有数条黑褐色放射状纹。胸甲三角形，黑褐色。螯肢赤褐色。前齿堤7齿，其前缘有一列长扁平毛。后齿堤无齿。可见一乳白色肉质块状物，由