

雄蛛体长3.90。步足多毛具长刺，刺基黑斑较雌蛛明显。

观察标本：2♀♀1♂。仿宋人祥等1992年对新疆尉犁标本的记载，1990年6月30日，陈桂英采。

地理分布：中国（新疆）、俄罗斯、乌克兰。

大兜肥蛛 *Larinia macrohoda* Yin et al., 1990 (图222)

Larinia macrohoda Yin et al., 1990 Spiders In China: 84, figs. 213—217 (♀)

雌蛛体长6.80。头胸部长3.30，宽2.00；腹部长3.50，宽2.70。前眼列强后曲。前中眼大于前侧眼，直径为前侧眼直径的两倍。前中眼间距约大于前中、侧眼间距。后眼列微后曲，四眼等大。后中眼间距约为后中、侧眼间距的1/6。背甲浅褐色，边缘黑色，中窝宽而粗，纵向。后中眼后方有一褐色纵带与中窝相连。颈沟、放射沟清晰可见。胸甲灰黑色，中央有浅色斑，与步足基节相对应处各有一黑斑。螯肢、颚叶褐色。下唇灰褐色。触肢、步足黄褐色，刺少而弱，足刺基部有红褐色斑。腹部背面白色粉状底上有灰黑色斑。正中有白色纵带。心脏斑粗短，具两对分枝。其后有一“人”字斑。此带两侧各有一条灰黑色纵带，外缘波浪状，各有6个黑点，后端有4条细的横纹相连。肌痕2对，第一对粗大。腹面黑色，两侧有一对浅黄色纵带。纺器灰黑色。外雌器具有一心形宽大的垂体，基部兜形，兜口向上，两侧凹陷。纳精囊椭圆形，一竖一横排列。




图222 大兜肥蛛 *Larinia macrohoda*

a. 雌蛛外形 body (♀), b—f. 外雌器 epigynum: b. 腹面观 ventral, c. 前面观 anterior, d. 背面观 dorsal, cleared, 大庸标本 (Dayong), e. 同上, 道县标本 (ditto, Daoxian), f. 腹面观 ventral, cleared

观察标本：1♀，湖南大庸张家界，1982年8月，王家福采，1♀，湖南绥宁，1984年8月，刘明耀采；1♀，湖南道县，1984年6月15日，龚联邈采。

地理分布：中国（湖南）。