

Speo Risso, 1826, Risso, Hist Nat. Fur. Merid. 4, p. 235.

Myosota Gray, 1847, Proc. Zool. Soc. London. p. 160.

Actaeon A. Adams, 1854, Proc. Zool. Soc. London. p. 58.

Type species: *Voluta tornatilis* Gmelin (= *Voluta tornatilis* Linnaeus (Original designation)).

壳呈卵圆—长圆形。小—中型，壳质薄或稍厚。螺旋部高，呈圆锥形。各螺层膨圆，胚壳小，易破碎。体螺层大，呈圆筒形。壳表雕刻有紧密或稀疏的深凹点列的螺旋沟，或仅见于壳的两端，或平滑。常饰有各色斑纹和螺旋色带。壳口大，呈长卵圆形，后角尖。外唇薄，中部弯曲，底部圆形。内唇石灰质层薄而狭或稍厚。轴唇基部有一个褶齿。脐呈狭缝状或不明显。生活在潮间带—潮下带深水区泥砂质底。我国已发现 3 种。

捻螺属 *Acteon* Montfort, 1810 种的检索表

- 1 (2) 壳呈卵圆形，体螺层的螺旋沟细密，5—6 螺层。…………… 卵圆捻螺 *Acteon teramachii*
- 2 (1) 壳呈长圆形，体螺层的螺旋沟稀疏。
- 3 (4) 6—7 螺层。体螺层、螺旋沟较密集。…………… 黑麦捻螺 *A. secale*
- 4 (3) 4 螺层，体螺层的螺旋沟在两端较密集，体螺层有二条褐色螺旋线。……………
…………… 希氏捻螺 *A. siebaldii*

(8) 黑荞麦捻螺 *Acteon secale* (Gould, 1859) (图版 2: 2)

Acteon secale Gould, 1859, 7: 140; Johnson, 1964, 239, pl. 12, f. 4.

贝壳小型，呈长卵圆形。壳长 4mm，壳宽 2mm。壳质薄，稍坚固。胚壳大，呈乳头状突起，约占壳长的 1/3。易磨损。光滑。各螺层膨胀圆形，螺旋部高，呈圆锥形，约占壳高的 1/4。缝合线浅，呈狭沟状。4 螺层，体螺层大，呈卵圆形，约占壳长的 3/4。壳表外观平滑，雕刻有深凹格组成的螺旋沟，这些螺旋沟在在体螺层有 20—22 条，在次体螺层 6—8 条，上一层 4—6 条。壳表生长线明显，在体螺层更清楚，与生长线相交叉呈格子状。壳口开口大，呈卵圆形。上部稍狭，底部扩张。外唇稍厚，稍弯曲，上部自体螺层上方约 2/3 处升起，中部稍向内弯曲，底部圆形。内唇石灰质层薄而狭。轴唇厚，弯曲，底部有一反褶缘。脐孔呈狭缝状。壳口内面白色。厣角质。

生态与分布：生活于潮间带—潮下带浅水区泥砂质底。报道分布于我国近海。我们尚未找到标本。图从 Johnson, R. I., 1964, Gould 采于我国的标本。

(9) 卵圆捻螺 *Acteon teramachii* Habe, 1950 (图版 2: 4)

Acteon teramachii Habe, 1950, 1 (6): 40, pl. 8, f. 3; 1955, 16—19: 56; 齐钟彦、林光宇等, 1986, III: 3.