

围绕：外为蓝色，内为黄色。外套楯的前端还有一条新月形的白色带。本鳃位于外套楯右后部，肛门位于鳃的后方。雌性孔位于鳃的右前下方。有卵精沟和位于头楯右前侧的雄性孔相联接。无齿舌和胃板。体侧有亨氏感觉器官。

贝壳退化，上层角质，下层石灰质。螺旋部小。体螺层大，呈圆形，占贝壳的绝大部分。顶部裂凹深，外缘突起高而尖。壳表生长线明显。

生态及分布：暖水性种类。生活在潮间带石头下、海藻、珊瑚礁间。见于我国海南省西沙群岛。不常见。广泛分布于印度-太平洋区：印度洋，南非东岸，毛里求斯岛，马绍尔群岛，新喀里多尼亚岛，日本（本州、小笠原岛），澳大利亚。

(142) 无饰燕尾海牛 *Chelidonura inornata* Baba, 1949 (图版 28: 3)

*Chelidonura inornata* Baba, 1949, pp. 22, 124, pl. 2, f. 5; Baba and Abe, 1959, 7 (2): 279; Habe, 1955, 16—19: 79; Marcus, 1965, 3 (2): 265; Rudman, 1970a, 2 (1): 7—8, figs. 1—2; 林光宇, 1975, 10: 144; 齐钟彦、林光宇等, 1986, III: 29.

动物小型，呈长圆形，扁平，光滑。体长 9mm，宽 2.3mm。头楯大，呈长圆形，占体长的 1/2。前端有 3 个具有纤毛的小丘突起。两前侧缘稍扩张。后端钝圆呈舌状。外套楯小于头楯。前端半圆形，后端分为 2 叶片、削细、同形，左叶稍长于右叶，呈燕子尾状。侧足稍发达，呈弯弓形，在背中部相会合，掩盖背部之一部分。足大，前端截断状，前侧隅圆形，后端呈圆形。体呈灰—黑色，光泽。侧足背面、足底散布有白色细小点。头楯、外套楯背面单色，没有这些小白点。头楯前缘三个小丘突起和外套楯后叶片的末端白色。两侧缘黄色。侧足内面白色线围绕。本鳃位于外套楯的右后侧。肛门位于鳃的后方。雌性孔位于鳃的右前方，有卵精沟和位于头楯右前侧的雄性孔相联接。无胃板和齿舌。体侧有亨氏感觉器官。

贝壳与前 2 种相似，体螺层外缘突起长，伸到背部右后叶。

生态及分布：暖水性种类。生活在潮间带石头下、海藻、珊瑚礁间。见于我国海南省西沙群岛。少见。太平洋区广泛分布：所罗门群岛，加罗林群岛，日本（本州、小笠原岛），澳大利亚均有分布。

(143) 黄斑燕尾海牛 *Chelidonura tsurugensis* Baba and Abe, 1959 (图版 28: 2)

*Chelidonura tsurugensis* Baba & Abe, 1959, 7 (2): 279—280, figs. 1—2; 林光宇, 1975, 10: 144, pl. 1, p. 9.

动物小型，呈长圆形。扁平、光滑。体长 6mm，宽 2.5mm。头楯大，呈长圆形。前端有三个具有感觉纤毛的小丘突起，后端钝圆。外套楯小于头楯，前端半圆形，后端分为 2 个不对称的叶片状突起，左叶长，削细，末端尖，伸出身体后方较远，右叶短而圆