

本(本州、四国、九州), 澳大利亚, 托里斯海峡, 斐济。

经济意义: 数量多, 可作为家禽的饲料。

(140) 条纹拟海牛 *Philinopsis lineolata* (Helbling & A. Adams, 1854) (图版 27: 5)

Aglaja lineolata Helbling & A. Adams, 1854, I : 27, pl. 58, f. 4; Pilsbry, 1896, 16: 49, pl. 1, f. 7; White, 1945, 26 (4): 97—101, figs. 1—14.

Aglaia lineolata (Helbling & A. Adams), Habe, 1955, 16—19: 79; Baba, 1949, pp. 21, 123—124, pl. 1, f. 2.

Doridium lineolata (Helbling & A. Adams). 林光宇、张玺, 1965, 7 (1): 4.

Philinopsis lineolata (Helbling & A. Adams). Rudman, 26 (4): 381, 397; Burn, 1978, 4 (1—2): 6; Lin Guangyu. (林光宇), 1990, 47 (1): 135; 齐钟彦、林光宇等, 1986, II : 27.

动物中大型, 呈长方形、肥厚。体长 22—26mm, 宽 11—13mm。头楯大, 呈长圆一方形, 占体长的 1/2 强。前端钝圆, 后端呈截断状, 在前端中部有一个钝圆的膨大凸起, 或称小丘。外套楯包被贝壳, 前端略呈圆形, 后端中央有一个缺刻, 分成 2 个相对称的短小叶片状突起, 伸出身体后方。足宽大, 几乎与身体同长。前侧隅有略呈三角形的扩大物, 后端呈截断状。侧足稍狭, 竖立于身体两侧, 与足没有明显的界限。本鳃位于外套右后侧。肛门位于鳃的右后方。雌性孔位于鳃的右前方, 有卵精沟与位于头楯右前侧的雄性孔相联接。体呈褐—紫红色。头楯、外套楯和侧足外面、足底均装饰有许多单一或分歧的蓝黑色横条纹。头楯的膨大凸起, 足前侧隅扩大物的边缘和外套楯后叶片状突起均为黑色。侧足内面淡黑色。

贝壳小型, 呈薄膜状, 呈圆形。顶部凹裂大, 螺旋部小, 体螺层扁平, 外缘先端锐利。壳表生长线明显。

生态及分布: 暖水性种类。生活在潮间带礁石间。见于我国海南省海南岛、西沙群岛。我国香港也有分布。广泛分布于印度-太平洋区: 印度布累尔港, 安达曼群岛, 夏威夷, 萨摩亚群岛, 泰国, 日本(本州)、澳大利亚。

43. 燕尾海牛属 *Chelidonura* A. Adams, 1850

Chelidonura A. Adams, 1850, Thes. Conch., 2: 561, 601.

Hirundella Gray, 1850, Fig. Moll. Anim., 4: 95.

Type species: *Bulla hirundinina* Quoy & Gaimard (Designated by Quoy & Gaimard, 1833).

体呈长圆形, 小型。头楯呈长圆形, 前端有感觉小丘突起。外套楯小于头楯, 后端