

(12) 火焰斑捻螺 *Punctacteon flammeus* (Gmelin, 1791) (图版 3: 2)

*Voluta flammeus* Gmelin, 1791, Syst. Nat., ed. 13: 3435.

*Tornatella flammeus* (Gmelin). Reeve, 1842, p. 59; 1865, 15: sp. 2.

*Acteon flammeus* (Gmelin). Pilsbry, 1893, 15: 151, pl. 20A. figs. 58—59; A. Adams, 1854, 22: 59; Habe, 1950, 1 (6): 40, pl. 8, f. 2; 1955, 16—19: 56; Baba, 1960, III: 125, pl. 62, f. 2; Kuroda et al., 1971: 282, 452, pl. 114, f. 15; Lin Guangyu (林光宇), 1990, 47(1): 135; 林光宇, 1989, 30: 170, f. 3.

贝壳中型，呈长卵圆形。壳长 15.5mm，壳宽 10mm。壳质薄，易破碎，灰白色，光泽。螺旋部短，呈尖锥形，占 5 螺层，约占壳长的 1/5。缝合线明显呈沟状。胚壳小，呈尖头状突起，平滑。6 螺层，各螺层稍膨圆。壳表雕刻有精细的深凹点组成的螺旋沟。这些螺旋沟在体螺层约 35—37 条，在次体螺层有 5—6 条。体螺层膨胀，呈圆筒状，约占壳长的 3/4。生长线明显与螺旋沟相交叉呈格子状。壳口宽大，呈长一卵圆形。上部狭，底部圆形。外唇薄，上部圆弯曲，向内斜，自体螺层上方约 1/5 处升起，中部弧形，底部狭圆。内唇石灰质层狭而薄、平滑。轴唇厚，稍弯曲，基部有一宽褶齿，在它的上部中央有一浅凹，形似 2 个褶齿。壳表装饰有 3—4 条间断的红色纵斑纹和 2 条白色螺旋带。脐孔呈狭缝状。壳口内面白色，透见壳表的红色斑纹。

生态与分布：暖水性种。生活于潮间带砂质底。见于我国海南省海南岛（榆林），不常见。广泛分布于印度-太平洋区：非洲东岸，马达加斯加，毛里求斯，斐济，托里斯海峡，印度尼西亚，汤加群岛，菲律宾，日本（本州、琉球群岛）。

(13) 缝线斑捻螺 *Punctacteon suturalis* (A. Adams, 1854) (图版 3: 1)

*Solidula suturalis* A. Adams, 1854, 22: 61; Pilsbry, 1893, 15: 139, 413, pl. 20A, figs. 66—67.

*Tornatella suturealis* (A. Adams). Sowerby, 1865, 15: sp. 9a, b. (non, Reeve, 1868).

*Punctacteon suturalis* (A. Adams), 林光宇, 1989, 30: 171, f. 5.

*Pupa suturalis* (A. Adams), Lin Guangyu (林光宇), 1990, 47 (1): 136.

贝壳中型，呈长卵圆形。壳长 18.8—19.5mm，壳宽 8.5—8.8mm。淡黄白色、光泽。壳质薄而相当坚固。螺旋部高，占 5—6 螺层，约占壳长的 1/5。胚壳小，呈乳头状突起，平滑。6—7 螺层，各螺层稍膨圆。体螺层膨胀，呈圆筒形。均占壳长的 4/5 弱。壳表雕刻有方格形深凹组成的螺旋沟。这些螺旋沟在体螺层约有 16 条，在次体螺层有 4 条。生长线明显，与螺旋沟交叉形成格子状。壳口开口稍狭，上部狭圆，底部稍扩张狭圆形。外