

- 7 (6) 喙部长于主体部
- 8 (9) 主体部圆形 大杓蛤 *C. kawamurai*
- 9 (8) 主体部菱形 直背杓蛤 *C. prolatissima*
- 10 (1) 右壳无前侧齿
- 11 (16) 壳顶位于背部近中央
- 12 (13) 铰合部直线状 温和杓蛤 *C. mitis*
- 13 (12) 铰合部弓形
- 14 (15) 两壳着带板突出, 并相等 长柄杓蛤 *C. steindachneri*
- 15 (14) 左壳着带板较突出, 两壳着带板不相等 宽体杓蛤 *C. macrorhynchus*
- 16 (11) 壳顶位于背部中央之前
- 17 (18) 壳表有斜行线同生长线相交 华美杓蛤 *C. elegans*
- 18 (17) 壳表无斜行线
- 19 (22) 壳表生长线细弱
- 20 (21) 两壳极膨胀, 喙部短 凸杓蛤 *C. convexa*
- 21 (20) 两壳不特别膨胀, 喙部长 日本杓蛤 *C. japonica*
- 22 (19) 壳表有粗的同心肋或波状肋
- 23 (24) 壳表具波状起伏 短喙杓蛤 *C. okezoko*
- 24 (23) 壳表具粗的同心肋
- 25 (26) 后背缘直 中国杓蛤 *C. chinensis*
- 26 (25) 后背缘微下陷, 末端微上翘
- 27 (28) 两壳着带板突出, 并相等 华贵杓蛤 *C. nobilis*
- 28 (27) 右壳着带板突出, 两壳着带板不相等 波纹杓蛤 *C. caduca*

短喙杓蛤 *Cuspidaria okezoko* Okutani, 1985 (图 129)

Cuspidaria okezoko Okutani, 1985, *Venus* 44 (3): 146, Figs. 1—5.
Cuspidaria okezoko Okutani, Xu, 1990, *Studia Mar. Sinica* 31: 180, Pl. 1, Fig. 9.

壳型中等大, 壳质薄脆, 两壳较膨胀, 略呈球形; 壳顶突出, 微前倾, 位于背部中央之后; 壳的前端圆, 前背缘微凸, 后部收缩, 形成一个短的喙, 末端开口, 后背缘微下陷; 壳表具粗的同心波状肋, 在壳的前端和后方的喙部无肋。

壳内面白色, 有相应于外表面的同心波状肋, 前闭壳肌痕小而圆, 后闭壳肌痕略呈三角形; 内韧带的着带板略呈长方形, 依附于后背缘, 微突出于铰合部, 左右两壳者相等; 右壳铰合部有一个后侧齿, 左壳无齿。




图 129 短喙杓蛤 *Cuspidaria okezoko* Okutani

出于铰合部, 左右两壳者相等; 右壳铰合部有一个后侧齿, 左壳无齿。

标本测量(mm)	壳长	壳高	壳宽
	20.0	14.0	6.0

标本采集地 东海（图 130），采到一片左壳。

地理分布 日本土佐湾和中国东海海域。

生态习性 我们的标本采自水深 365—395m 的软泥底，在日本采自 400m 深处。




图 130 短喙杓蛤 *Cuspidaria okezoko* (▲); 华贵杓蛤 *C. nobilis* (△); 波纹杓蛤 *C. caduca* (●); 长柄杓蛤 *C. steindachneri* (○)。