

标本测量(mm)	壳长	壳高	壳宽
	14.5	9.6	5.1
	16.0	9.7	6.1
	17.2	10.0	6.0
	17.8	10.8	6.5

标本采集地 南海南沙群岛水域（图 40）。在 1987—1988 年调查中，共出现三个站次，获得 17 个标本。

地理分布 目前仅知分布于中国南海海域。

生态习性 本种分布的水深范围很狭窄，三个样品分别采自水深 127,136 和 146m。

矮尼罗蛤 *Neilo humilor* (Prashad, 1932) (图 37)

Malletia humilor Prashad, 1932, *Siboga Exped. Monogr.* 53c: 26, Pl. 8, Fig. 3, 4.

Malletia humilor Prashad, Okutani, 1966, *Bull. Tokai Reg. Lab.* 46: 5, Pl. 1, Fig. 2.

Pseudomalletia humilor (Prashad), Habe, 1977, *Syst. Moll. Jap. Bi. Sca.* 1977: 19.

Malletia humilor Prashad, Xu, 1990, *Oceanol. Limnol. Sinica* 21(6):559.




图 37 矮尼罗蛤 *Neilo humilor* (Prashad)

壳中等大，壳质较厚，两壳较膨胀；壳顶位于背部中央之前，向前倾；前背缘短而直，后背缘长，微下陷，末端微上翘；壳的前端圆，后部扩张，末端截形；壳表具规则的同心肋，肋间沟的宽度同肋宽约相等；壳皮很薄，淡黄色；小月面和楯面均细长；双向性外韧带，但以壳顶后的部分较强壮；壳的前、后端微开口。

壳内白色，无真珠光泽，外套线和闭壳肌痕不明显；铰合齿较壮，共 37 个，其中在壳顶前为 15 个，壳顶后为 22 个，两者在壳顶下互相连接。

标本测量(mm)	壳长	壳高	壳宽
	13.6	8.9	6.5

标本采集地 南海珠江口外，海南岛东南方（图 35），出现一次一个标本。

地理分布 印度尼西亚（1301m），日本奄美大岛外海（950m）和中国南海海域。

生态习性 本种为深水种，我们的标本采自水深 1100m 的软泥底，其垂直分布范围较狭窄，为 950—1301m。

小尼罗蛤属 *Neilonella* Dall, 1881

Neilonella Dall, 1881, *Bull. Mus. Comp. Zool.*, 9: 125.

Type species: *Leda* (*Neilonella*) *corpulenta* Dall, 1881.

壳较厚重，表面具有较强的同心刻纹，前缘圆，后端尖细；铰合部较粗壮，外韧带位于壳顶之后，内韧带小；壳内面具外套窝。

肉体部具水管，后肠在身体右侧形成一个迂回环。

芝麻小尼罗蛤 *Neilonella aequatorialis* (Thiele, 1931) (图 38)

Tindaria (*Neilonella*) *aequatorialis* Thiele, 1931, *Deutsch. Tiefsee Exped.* 21 (1): 52, Pl. 8, Fig. 74.

Neilonella aequatorialis (Thiele), Xu, 1990a, *Oceanol. Limnol. Sinica* 21 (6): 560.




图 38 芝麻小尼罗蛤 *Neilonella aequatorialis* (Thiele)

贝壳小型，略呈三角形，较膨胀，壳质非常坚厚；壳顶突出，向内向前倾斜，位于