




图 144 和平蛤 *Clementia papyracea* 在南海的分布

贝壳内面半透明、白色，铰合部窄小，左右两壳各有三枚分散排列的主齿、薄片状，右后主齿通常分叉或由两薄片组成。贝壳内缘光滑，闭壳肌痕、外套痕不清楚，外套窝弯入深、斜伸向贝壳中部。

测量 (mm)

壳长	壳高	壳宽	
57	42	/	(广东乌石)
31	23	16	(福建东山)
20	15	12	(南海浅海)

生活习性与地理分布 分布于福建以南、广东、广西北部湾和海南南部。生活在浅海区沙泥质海底，从 28—87m 深处均有发现，潮间带没有分布。日本本州陆奥湾、奄美大岛以南，菲律宾沿岸，马六甲，新加坡，澳大利亚（北部的托列斯海峡、西部和东部的莫尔顿湾），印度洋的孟买，斯里兰卡，桑给巴尔等地。1929 年，Laveczzari 曾在我国采到过标本。

(88) 薄壳和平蛤 *Clementia vatheleti* Mabilie, 1901 (图 145)

Clementia Vatheleti Mabilie, 1901. *Bull. Soc. Philom.* Paris, 9 Ser., 3: 57; Zhuang Qiqian,

1964. *Stud. Mar. Sinica*, 5: 88, pl. VII, fig. 9; Fischer-Piette *et* Vukadinovic, 1972. *Jour. Conchy.* CIX (IV): 159—163, figs. 18—22.

Clementia annandalei Preston, 1914. *Rec. Ind. Mus.*, 10: 306, fig. 14a—b.

形态 贝壳大型。略透明、壳质脆，长度和高度几近相等。壳顶靠近贝壳中央部，略靠前方。由壳顶往前方略弯曲、往后斜长，前后相交几成 90° 角。贝壳前、后端均圆、腹缘亦圆、弧形。如果从贝壳前端至后端划一直线，可以明显看出贝壳上半部比下半部小，上半部呈三角形，下半部呈圆形。壳面灰白色，新鲜标本贝壳常染成棕锈色。同心生长纹极细密，排列不规则，从壳面可见到该蛤在不同生长期留下凹凸不平的生长纹。小月面很大，占据从壳顶到前端的位置，但界线不清，小月面上有与壳面生长相衔接的纹；楕面略凹且界线不明，韧带黄棕色、较短。

贝壳内面白色，壳缘锐薄。铰合部窄，其下缘略弯曲，齿式简单，左壳前主齿薄而高、距中央主齿远，中央主齿大，与呈薄片状的后主齿并列呈斜向排列；右壳前主齿薄而高、与大的中央主齿紧相邻、后主齿距离远、斜向韧带脊，分叉。前闭壳肌痕长，后闭壳肌痕清楚，外套窝宽且深、指向贝壳中央，先端尖。

测量 (mm)

壳长	壳高	壳宽	
83	78	46	(山东青岛)
80	69	45	(山东乳山)
67	58	39	(山东烟台)




图 145 薄壳和平蛤 *Clementia xatheleti*

生活习性与地理分布 生活在潮间带下部至数米深的泥沙质海底，营埋栖生活。动物体水管较长，潜埋很深，可达 30cm，标本采出后，贝壳完全被泥包被。我国仅在北

部沿海如山东（烟台、青岛、石岛）、河北（昌黎、北戴河）、辽宁（夏家河子、菊花岛）等地有分布；日本房总以南，朝鲜半岛均有分布。

讨论 Fischer-Piette 和 Vukadinovic (1972) 指出, Preston (1914) 定的 *Clementia annandalei* 新种, 贝壳长 17mm, 是本种的年幼个体, 他们在叙述这一种时还刊出 5 幅照片, 其形态与我们的标本酷似。Mabille 1901 年描述的标本长 68—77mm、高 65—72mm; Jukes-Browne 1913 年描述的标本长 73、高 68mm, 而 Kuroda 和 Habe 1971 年在日本相模湾描述的标本长 69.3mm、高 69.0mm。我们在山东青岛采到的一枚死壳长 96mm、高 84mm, 是这一种的最大型记录。