




图 92 顶大多面水母 *Abyla schmidtii* Sears

1982 年 12 月，高尚武等；西沙群岛的中建岛、金银岛、珊瑚岛等，1978 年 3 月，洪惠馨等。

生活习性 可栖息于 0—1 900 m 各水层。周年出现于东沙、西沙群岛周围海区以及南沙群岛北部海区。

地理分布 东海、南海；太平洋、大西洋和印度洋热带赤道水域。

71. 横棱多面水母 *Abyla haeckeli* Lens et van Riemsdijk, 1908

Abyla haeckeli Lens et van Riemsdijk, 1908, *Siboga Exped.*, **9** (38): 32.

Abyla haeckeli Bigelow, 1911, *Mem. Mus. Comp. Zool. Harv.*, **109** (1): 39—42.

Abyla haeckeli Totton et Bargmann, 1965, *Trustees of The British Museum London*, 210—211.

Abyla haeckeli 张金标, 1984, 西太平洋热带水域浮游生物论文集, 77 页.

形态特征

多营养体期：前泳钟体长 4.4—6.8 mm。这种水母主要特征是顶腹面和腹面之间有 1 条横棱，使腹面成为五角形（腹面观），侧棱约在钟高 1/2 处与水平棱交叉形成 1 个侧突，将腹侧面分成 2 个大致相等的顶腹面和基腹面（图 93）。

后泳钟体未发现。

采集地点 东海（127°00'E—32°30'N），1978 年 5 月，东海（128°00'E—29°28'N），1978 年 6 月，高尚武等；汕头外海，1959 年 8 月，王金台等。

生活习性 主要栖息在 200 m 上层。东海经常出现于冲绳海槽；南海冬、春季出现




图 93 横棱多面水母 *Abyla haeckeli* Lens et van Riemsdijk

A. 多营养体期前泳钟体; B. 单营养体期。

于东沙群岛东北、东南海区，但数量不多。

地理分布 东海、南海；太平洋、大西洋、印度洋，主要分布于赤道水域，地中海。

72. 多面水母 *Abyla tottoni* Sears, 1953

Abyla tottoni Sears, 1953, *Bull. Mus. Comp. Zool. Harv.*, **109** (1): 46—47.

Abyla tottoni Totton, 1954, *Discovery Rep.*, **27**: 151.

Abyla tottoni Totton et Bargmann, 1965, *Trustees of The British Museum London*, 214—215.

Abyla tottoni Alvarino, 1971, *Bull. Scripps Inst. Oceanogr.*, 146.

形态特征

多营养体期：前泳钟体长 4.7—5.3 mm。钟体胶质硬，不甚透明。各条棱都很圆钝突出，界限不清楚，侧棱和水平棱交叉处不形成明显的突出，但向两侧突出如耳朵状（腹面观或背面观），




图 94 多面水母 *Abyla tottoni* Sears