

这一属包括的种类，均为暖水性种，广分布于印度西太平洋区。

种的检索表

- 壳稍大，等侧 欧氏薄齿扇贝 *Bractechlamys oweni*
壳较小，不等侧 彩薄齿扇贝 *Bractechlamys coruscans coruscans*

65. 欧氏薄齿扇贝 *Bractechlamys oweni* (Gregoria, 1842)

Pecten pictus Sowerby, 1842: 62, pl. 20, fig. 233; Reeve, 1853: sp. 16.

Pecten oweni De Gregorio, 1884: 133 (Nat. Scid. Ann. Terzo 5, 133).

Chlamys (*Aequipecten*) sp. cf. "*picat* (Sowerby)" 黑田德米, 1932: 75, fig. 108.

Cryptopecten oweni 波部忠重, 1951: 77; 1977: 84; Kuroda & Habe, 1981: 67, pl. 5, fig. 2.

Comptopallium oweni Hayami, 1984: 117.

Semipallium oweni Dijkstra, 1990a: 8, 10.

Bractechlamys oweni Dijkstra, 1998: 16.

模式标本产地 菲律宾 (Baicus)。

地理分布 台湾 (花莲, 鹅荖鼻); 广分布于印度西太平洋区, 日本奄美以南, 菲律宾, 印度尼西亚。

形态描述 贝壳小, 壳质较薄, 略呈卵圆形或近三角形。贝壳较扁平、稍凸。两壳大小相等, 壳两侧略等。壳背缘较直, 有锯齿; 腹缘呈圆形。壳顶位于背缘中部, 其前方和后方具有壳耳; 两壳耳几乎相等, 略呈三角形。壳表具有 13 条放射肋; 放射肋有角, 并且其边缘和中间部分有小锯齿; 肋间距离较窄, 并有两小沟和锯齿。壳表呈原白色, 并具有宽而不规则的放射带和细的横线, 以及较鲜艳的红色斑。壳长 19.3 mm, 高 19.4 mm。

生态习性 暖水性种, 栖息在潮间带至潮线下 20 m 的浅水水域, 底质为沙底。




图 81 欧氏薄齿扇贝 *Bractechlamys oweni* (Gregoria) (仿 Kuroda & Habe)

66. 彩薄齿扇贝 *Bractechlamys coruscans coruscans* (Hinds, 1845) (图版 V: 1)

Pecten coruscans Hinds, 1845: 61—62, pl. 17, fig. 3 (Voyage Zoologique (Suphur)); Reeve, 1853: no. 149 (not 143), pl. 33, fig. 149; Küster & Kobelt, 1888: 259, pl. 67, fig. 9.

Pecten cuneolus Reeve, 1853: pl. 29, fig. 131.

Pecten schmeltzii Dunker in Küster & Kobelt, 1888: 272, pl. 71, figs. 5—6.