

细沙、碎壳等。

### 58. 细肋珊瑚扇贝 *Coralichlamys jousseaumei* (Bavay, 1904) (图版 V: 4)

*Chlamys jousseaumei* Bavay, 1904: 203—204, pl. 6, figs. 9—10; Abbott et Dance, 1983: 313.

*Chlamys* (*Chlamys*) *jousseaumei* Kuroda & Habe, 1971: 570—571, pl. 79, figs. 14, 15.

*Chlamys* (*Coralichlamys*) *jousseaumei* 波部忠重, 1977: 81; Kuroda, & Habe, 1981: 64; Wang, 1983: 49, pl. 1, fig. 1.

**模式标本产地** 日本。

**地理分布** 南海(海南岛以东外海)及北部湾; 日本本州(房总以南)、四国、九州。

**形态描述** 贝壳较小, 壳质较薄, 略近圆形。壳背缘直, 腹缘呈圆形。壳顶小, 稍尖, 位于背缘略近壳后方, 壳顶前方和后方有壳耳; 两壳耳不等, 前耳大而后耳较小; 左壳前耳约呈等边三角形, 后耳呈等腰三角形, 耳上均有细放射肋和环肋; 右壳前耳形长, 耳上的放射肋粗大, 具有明显的足丝孔和 5—6 枚细栉齿。右壳后耳多呈等腰三角形。壳表具有 21—24 条细放射肋; 肋细、较规则, 肋上的生长棘细而较尖, 排列稀疏; 肋间距离较宽, 有的两肋间还有更细的小肋。生长纹细密, 较明显。两壳表均呈淡褐色或近乳白色, 一般左壳的颜色较右壳的深。贝壳内面色浅, 多近白色, 略具光泽。闭壳肌痕较明显, 有与壳表放射肋相应的肋沟, 壳缘具缺刻。铰合部细长; 韧带呈红褐色, 位于三角形的韧带槽中, 中央关节较明显。

**软体部** 外套薄, 半透明; 外套缘较厚, 具有较发达的触手; 触手长短相间排列, 较紧密; 长触手较粗大, 触手的基部有外套眼; 外套眼较大, 数目也较多。闭壳肌呈椭圆形, 位于体中部近后背侧。唇瓣小, 近三角形。足粗短, 呈棒状。

#### 测量

	壳长 (mm)	壳高 (mm)	壳宽 (mm)
1	14.0	15.2	4.2
2	12.5	14.0	4.2
3	10.2	11.2	3.0

**生态习性** 暖水性种, 仅见于潮下带, 垂直分布水深 73—290 m, 据载有的海区为 50—600 m; 底质为泥沙、钙质粉沙等。

### 59. 虫斑珊瑚扇贝 *Coralichlamys larvatus* (Reeve, 1853) (图版 III: 3)

*Pecten larvata* Reeve, 1853: pl. 34, fig. 158; Kobelt, 1886—1888: 125—126, pl. 25, fig. 5.

*Chlamys larvatus* Kira, 1975: 139, pl. 50, fig. 5; Abbott et Dance, 1983: 312.

*Chlamys* (*Coralichlamys*) *larvata* 波部忠重, 1977: 81; Kuroda et Habe, 1981: 64.