

81. 黄拟套扇贝 *Semipallium wardiana* (Iredale, 1939) (图版Ⅲ：4)

Complicachlamys wardiana Iredale, 1939: 362—363, pl. 5, figs. 25, 25a; Dijkstra, 1991b: 37—38.

Semipallium wardiana Abbott & Dance, 1983: 308.

Semipallium (Semipallium) fulvicostatum Wang, 1985: 502—503, fig. 2.

Complicachlamys wardiana Wagner, 1989b: 111—116, figs. 68.

模式标本产地 昆士兰。

地理分布 广西涠洲岛、海南崖县和新村；菲律宾，印度尼西亚，澳大利亚及日本本州以南。

形态描述 贝壳中等大小，一般壳高大于壳长，壳质较薄，但较坚韧，贝壳略呈圆扇形。壳较扁平，右壳略较左壳凸，两壳略等，壳两侧不等。壳背缘较直，腹缘及前后缘较圆。壳顶位于背缘稍偏后方，较尖小，不凸出背缘；壳顶前方和后方有明显的壳耳。两壳耳不等，前耳大而后耳较小，两耳均呈三角形；右壳前耳下方具有明显的足丝孔和5—6枚细栉齿。壳表具有9条左右的宽大放射主肋；主肋呈圆形略高，主肋间及主肋上都布满细放射肋；一般细放射肋光滑、不分枝，排列整齐。壳色变化较大，有红色、橘红色、黑紫色和褐色等，并具有浅褐色花斑，一般壳顶附近颜色较浅而近壳缘处色较深。贝壳内面色浅，多呈浅红、浅紫或浅驼色；有与壳表放射肋相应的肋和沟；闭壳肌痕略显或不明显。铰合部较直；韧带呈褐色，位于三角形的韧带槽中，一般中央关节不明显。

软体部 两外套较薄；外套缘较厚，具有浅褐色和深褐色色素，其中层具有较发达的外套触手；触手有长有短，较粗壮，排列整齐，触手的基部有外套眼；眼较大，数目也较多。外套缘膜发达，但边缘的触手较短。闭壳肌较大，近圆形，位于体后背侧。唇瓣三角形，白色，稍大。上唇有分枝，较发达。足较大，长，前半部呈白色，后半部呈浅褐色，足丝沟较深。足丝细软，呈浅褐色。

测量

	壳长 (mm)	壳高 (mm)	壳宽 (mm)
1	45.5	39.5	12.5
2	41.5	33.6	12.0
3	33.0	27.5	8.0

生态习性 为暖水性种，生活在潮间带低潮线附近至潮线下浅水水域。营附着生活，以足丝附着在岩石、珊瑚礁或石块等物体上。在自然海区中，其贝壳表面常附着有苔藓动物，多毛类和软体动物等。

经济意义 肉可食用，贝壳美丽，可做装饰品。但产量不大。