

前部有淡橙色的盾片), 背部有 2 对暗色的肌斑, 体表有长棕毛和短刚毛。前纺器是典型的平腹蛛科的纺器, 腹方有 1 个短纺管, 背方有 8 个长纺管。雄蛛触肢胫节有粗壮的后侧突; 端突末端尖, 重叠在插入器上方, 中突长形, 位于生殖球远端。外雌器前部有窄的中片, 前生殖管前侧部有球状的扩展部。

Type species: *Urozelotes cardiagynus* Mello-Leitao, = *U. rusticus* (L. Koch, 1872).

本属我国已知 2 种。

种的检索表

- 1. 雌蛛 2
雄蛛 3
- 2. 外雌器的前缘倒“V”形 村尾狂蛛 *U. rusticus*
外雌器的前缘平直 于田尾狂蛛 *U. yutian*
- 3. 触肢胫节突基部宽大, 末端尖 村尾狂蛛 *U. rusticus*
触肢胫节突基部稍窄, 末端较钝 于田尾狂蛛 *U. yutian*

(131) 村尾狂蛛 *Urozelotes rusticus* (L. Koch, 1872) (图 140)

Prothesima rustica L. Koch, 1872: 309.
Zelotes rusticus: Zhang, 1987: 188, f. 160.
Urozelotes rusticus: Platnick & Song, 1986: 20, f. 75~78; Xu, 1990: 1, f. 5; Song, Zhu & Chen, 1999: 456, f. 265H, R; Song, Zhu & Chen, 2001: 359, f. 234.

雄蛛体长 7.60~12.00。一雄蛛体长 7.77: 头胸部长 3.29, 宽 2.43; 腹部长 4.44, 宽 2.20。背甲浅棕色, 周缘有黑褐色细纹, 卵圆形; 前端较窄, 以第 II、III 步足之基节间为最宽, 头区微抬起; 颈沟和放射沟可见, 中窝明显, 褐色细缝状。8 眼 2 列, 背面观前眼列微后凹, 后眼列基本平直并长于前眼列; 前中眼圆形, 黑色; 后中眼椭圆形, 显珍珠白色, 并呈倒“八”字形排列, 侧眼椭圆形。后中眼>前侧眼>后侧眼=前中眼 (0.15:0.14:0.13:0.13), 前中眼间距 0.08, 前中、侧眼间距 0.01, 后中眼间距 0.04, 后中、侧眼间距 0.06, 前、后侧眼间距 0.06; 中眼域长大于宽 (0.37:0.36), 前边小于后边 (0.34:0.36)。螯肢深褐色, 有侧结节, 螯基背面生有黑色长刚毛, 前齿堤 4 齿, 后齿堤 2 小齿。颚叶褐色, 长大于宽, 基本平行, 外缘中上部有凹陷, 端部颜色淡, 有白色毛丛, 腹面中央有斜向的凹陷。下唇长大于宽, 舌形, 端部圆钝, 有几根长刚毛, 基部两侧颜色较深。胸板长心形, 黄褐色, 前端平截, 后端稍尖, 但不伸入第 IV 步足基节间, 周缘密被长毛并有角质化突出伸向基节处。触肢和步足橙黄色, 生有黑色短毛; 步足转节腹面无缺刻; 第 III、IV 步足后跗节末端有清理梳; 各步足跗节和 I,

Ⅱ步足后跗节端部有毛丛。步足测量：Ⅰ 9.99 (2.61 + 3.92 + 1.98 + 1.48)；Ⅱ 8.44 (2.34 + 2.97 + 1.71 + 1.42)；Ⅲ 7.29 (1.98 + 2.35 + 1.84 + 1.12)；Ⅳ 11.33 (2.88 + 3.95 + 3.02 + 1.48)。足式：4123。腹部淡黄色，长筒形，长于头胸部，被有少许黑色细短毛；其前端有一略呈三角形的深色背盾，长度约为腹部长度的 $1/5$ ；背面中央还有 2 对清晰可见的肌痕；腹面淡黄色，中央具 2 深色细纵纹；书肺板黄色。前纺器橙黄色，筒状，较粗壮，其端部具 7 个大纺管；其余 4 个纺器较细小，颜色较浅。触肢胫节有粗壮的后侧突，端部突然趋尖；端突末端尖，重叠在插入器上方；中突长形，位于生殖球顶端。

雌蛛体长 6.56~12.00。一雌蛛体长 6.98：头胸部长 3.15，宽 2.25；腹部长 3.83，宽 2.16。背甲浅棕色，卵圆形；头区微抬起；颈沟和放射沟可见，中窝明显，褐色细缝状。8 眼 2 列，背面观前眼列微后凹，后眼列微前凹并长于前眼列；后中眼 > 前侧眼 > 后侧眼 = 前中眼 (0.15:0.14:0.13:0.13)，前中眼间距 0.05，前中、侧眼间距 0.01，后中眼间距 0.04，后中、侧眼间距 0.05，前、后侧眼间距 0.06；中眼域长等于宽 (0.36:0.36)，前边小于后边 (0.27:0.36)。步足测量：Ⅰ 8.88 (2.34 + 3.48 + 1.71 + 1.35)；Ⅱ 7.51 (2.03 + 2.79 + 1.57 + 1.12)；Ⅲ 6.84 (1.98 + 2.16 + 1.58 + 1.12)；Ⅳ 10.26 (2.61 + 3.60 + 2.70 + 1.35)。足式：4123。腹部淡黄色，长筒形，背面中央有 2




图 140 村尾狂蛛 *Urozelotes rusticus* (L. Koch)

A. 外雌器外面观 (epigynum, ventral view); B. 同上，内面观 (same, dorsal view); C. 雄蛛左触肢器腹面观 (left palpal organ of male, ventral view); D. 同上，外侧面观 (same, retrolateral view)。

(仿 Platnick & Song, 1986)

对清晰可见的肌痕；腹面淡黄色。外雌器前部具球拍状中片；前纳精囊管前侧有球状的扩展部。

能栖息于房屋内并被携带各地，故分布甚广。

镜检标本 1♀，福建建阳，1979. X .2；1♀，湖南长沙，1983. IX，颜亨梅采；1♀1♂，安徽单县，1984. VIII，徐亚君采；2♂♂，河北石家庄，1988. V .27，朱明生采。

分布 河北、安徽、福建、湖南；俄罗斯、欧洲、美洲。

(132) 于田尾狂蛛 *Urozelotes yutian* Platnick et Song, 1986 (图 141)

Zelotes yutian Platnick & Song, 1986: 12, f. 41~44; Hu & Wu, 1989; 299, f. 240; Marusik & Logunov, 1994: 197, f. 88~90; Song, Zhu & Chen, 1999: 464, f. 267G, M.

Urozelotes yutian: Esyurnin & Efimik, 1997: 111, f. 16, 19~22 (Transferred from *Zelotes*); Platnick, 2001: 219; Tuneva & Esyunin, 2002: 233.

雌蛛体长 3.98~5.00。一雌蛛体长 3.98：头胸部长 1.66，宽 1.21。背甲呈棕褐色，周缘有黑褐色网纹；前端较窄，以第Ⅱ、Ⅲ步足之基节间为最宽，中央部颇隆起；放射沟呈黑褐色。第Ⅱ步足腿节长 1.13。8眼2列，背面观前眼列微后凹，后眼列弱后凹，并长于前眼列；后中眼椭圆形，显珍珠白色，并呈倒“八”字形排列。前侧眼=后中眼=后侧眼>前中眼 (0.06:0.06:0.06:0.04)，前中眼间距 0.06，前中、侧眼间距 0.02，后中眼间距 0.05，后中、侧眼间距 0.05，前、后侧眼间距 0.06；中眼域长等于宽 (0.17:0.17)，前边小于后边 (0.14:0.17)。螯肢棕褐色，前齿堤 3 齿，后齿堤一齿。颚叶浅黄色，长大于宽，略呈矩形，外缘中上部有凹陷，端部颜色淡，有白色毛丛，腹面中央有斜向的凹陷。下唇长大于宽，舌形，端部圆钝，有几根长刚毛，基部两侧颜色较深。胸板长心形，黄褐色，前端平截，后端稍尖，但不伸入第Ⅳ步足基节间，周缘密被长毛并有角质化突出伸向基节处。步足呈棕褐色，第Ⅲ、Ⅳ步足多刺；步足转节腹面无缺刻；第Ⅲ、Ⅳ步足后跗节末端有清理梳；各步足跗节和Ⅰ，Ⅱ步足后跗节端部有毛丛。足式：4123。腹部呈长圆柱状，深褐色，隐约可见 2 对肌痕；腹面颜色较淡，中央具两条纵纹。前纺器黑色，粗壮，圆筒状，其末端有 3 个长纺管，其余纺器较细小。外雌器前缘宽大，中纳精囊管窄，侧纳精囊管突出成两个球形的扩展部。

雄蛛体长 2.81~3.50。一雄蛛体长 2.81：头胸部长 1.23，宽 0.95。第Ⅱ步足腿节长 0.83。眼的大小和间距：前侧眼>后侧眼=后中眼>前中眼 (0.06:0.05:0.05:0.04)，前中眼间距 0.05，前中、侧眼间距 0.02，后中眼间距 0.05，后中、侧眼间距 0.03，前、后侧眼间距 0.03；中眼域长小于宽 (0.13:0.15)，前边小于后边 (0.13:0.15)。足式：4123。触肢器之胫节外末角突起呈拇指状；插入器基部粗短；端突狭窄。其他形态结构皆同雌体。