

0.05), 前中眼间距 0.08, 前中、侧眼间距 0.02, 后中眼间距 0.05, 后中、侧眼间距 0.08, 前、后侧眼间距 0.06; 中眼域长等于宽 (0.21:0.21), 前边小于后边 (0.18:0.21)。螯肢棕褐色, 前齿堤 3 齿, 后齿堤 2 齿。触肢与螯肢同色。颚叶黄褐色, 其前侧外缘凹陷, 内侧角显白色并被有灰黑色毛丛。下唇长大于宽, 褐色。胸板黑褐色, 被有黑褐色长刚毛。步足黑褐色; 第Ⅱ步足腿节长 1.35; 第Ⅲ步足腿节有 2 根背刺, 前、后侧各 2 根刺 (0-1-1), 胫节有 3 对刺, 前、后侧各 2 根刺 (0-1-1), 后跗节具 3 对腹刺, 前后侧各 3 根刺 (1-1-1), 第Ⅳ步足腿节有 2 根背刺, 前侧 1 根刺 (0-0-1), 后侧具 2 根刺 (0-1-1), 胫节有 3 对腹刺, 前、后侧各 2 根刺 (1-0-1), 后跗节有 3 对腹刺, 前侧有 3 根刺 (1-1-1), 后侧有 2 根刺 (0-1-1)。各步足跗节腹面具步足毛丛。腹部长圆柱状, 背面前端之底色为灰黄色, 后半部呈黑褐色, 整个腹背密被黑色短毛, 中央部位显有 3 对长棒状黄色肌斑; 腹面呈灰黄色, 正中央部位显有 2 条黄色线纹。前纺器粗壮, 黄褐色。外雌器前缘明显, 两侧缘偏斜, 侧缘与后缘相连; 中纳精囊管前粗后窄; 副中纳精囊管端部小球形。

见于山野云杉丛林之石隙间。

镜检标本 1♀ (正模), 新疆昭苏, 1700M, 1982.VIII.25, 胡金林采。

分布 新疆。




图 155 胡氏狂蛛 *Zelotes hui* Platnick et Song

A. 外雌器外面观 (epigynum, ventral view); B. 同上, 内面观 (same, dorsal view)。

(147) 赫氏狂蛛 *Zelotes hummeli* Schenkel, 1936 (图 156)

Zelotes hummeli Schenkel, 1936: 255, f. 84; Platnick & Song, 1986: 13, f. 45~48; Hu & Wu, 1989: 295, f. 235, 3~4; Song, Zhu & Chen, 1999: 456, 266G, M.

雌蛛体长 5.00~6.40。一雌蛛体长 5.00: 头胸部长 2.00, 宽 1.40。后眼列长

0.50。背甲棕褐色，周缘显黑褐色，前端不特别狭窄，以第Ⅱ、Ⅲ步足之基节间为最宽，中窝纵向。8眼2列，背面观，两眼列皆微后凹，后眼列稍长于前眼列；后中眼不成圆形，乳白色；前侧眼>后侧眼>后中眼=前中眼，前中眼间距大于前中、侧眼间距，后中眼间距大于后中、侧眼间距；中眼域长大于宽，后边大于前边。螯肢棕褐色，前齿堤3齿，后齿堤仅一小齿。触肢赤褐色。颚叶呈棕褐色，其前缘外侧显著凹陷，内侧角呈灰白色，并具褐色毛丛。下唇长大于宽，黑褐色。胸板棕褐色，第Ⅲ、Ⅳ步足胫节具3对腹刺，各跗节具步足毛丛。步足测量：Ⅰ 5.10 (1.40 + 2.00 + 0.90 + 0.80)；Ⅱ 4.50 (1.20 + 1.80 + 0.80 + 0.70)；Ⅲ 3.90 (1.00 + 1.40 + 0.80 + 0.70)；Ⅳ 6.10 (1.60 + 2.10 + 1.50 + 0.90)。足式：4123。腹部呈长圆柱状，背面黑褐色，密被黑色短毛；腹面灰褐色，密被黄色点斑。外雌器前缘中部向后方突出；两侧缘间距前宽后窄；后缘弧形，不与侧缘相接；侧纳精囊管前端扩展。

雄蛛体长3.80：头胸部长1.90，宽1.40。前眼列长0.40。背甲棕褐色，以第Ⅱ、Ⅲ步足之基节间为最宽，中窝纵向。步足测量：Ⅰ 4.90 (1.30 + 1.90 + 1.00 + 0.70)；Ⅱ 3.70 (1.00 + 1.30 + 0.70 + 0.70)；Ⅲ 3.70 (0.90 + 1.30 + 0.80 + 0.70)；Ⅳ 5.50 (1.30 + 2.00 + 1.30 + 0.90)。足式：4123。腹部呈长圆柱状，背面黑褐色，腹面灰褐色。触肢器的插入器如倒置的鞋状；中突的基部朝上，末端在下，末端的尖向上




图 156 赫氏狂蛛 *Zelotes hummeli* Schenkel

A. 外雌器外面观 (epigynum, ventral view); B. 同上，内面观 (same, dorsal view); C. 雄蛛左触肢器腹面观 (left palpal organ of male, ventral view); D. 同上，外侧面观 (same, retrolateral view)。

(仿 Platnick & Song, 1986)

方、内方钩曲；胫节的外侧突短，基部短宽，末端尖细。

见于内陆湖边草丛。

镜检标本 1♀，新疆塔城，1983.VII.8，胡金林采。

分布 内蒙古、新疆。

(148) 韩狂蛛 *Zelotes keumjeungsanensis* Paik, 1986 (图 157)

Zelotes keumjeungsanensis Paik, 1986: 29, f. 22 ~ 28; Tang, Song & Zhang, 2003: 18 ~ 19. f. 1.

雄蛛体长 4.56~4.73。一雄蛛体长 4.73：头胸部长 2.34，宽 1.68；腹部长 2.53，宽 1.53。背甲卵圆形，棕褐色，颈沟不明显，背甲两侧有一些不规则的放射纹，边缘黑色，后缘轻微内凹；中窝纵向，红棕色细缝状。眼区浅黑色，8 眼 2 列，背面观前眼列微后凹，后眼列平直并长于前眼列；前中眼黑色，圆形；后中眼珍珠白色，不规则卵圆形；侧眼椭圆形；前侧眼 = 后侧眼 > 后中眼 > 前中眼 (0.08:0.08:0.07:0.06)，前中眼间距 0.06，前中、侧眼间距 0.02，后中眼间距 0.08，后中、侧眼间距 0.07，前、后侧眼间距 0.07；中眼域长小于宽 (0.21:0.23)，前边小于后边 (0.19:0.23)。额高稍




图 157 韩狂蛛 *Zelotes keumjeungsanensis* Paik

A. 雄蛛背面观 (male); B. 雄蛛左触肢器腹面观 (left palpal organ of male, ventral view); C. 同上，外侧面观 (same, retrolateral view)。