

4 柄节前端具 1 尖齿和 1 小尖突, 及 1 齿等, 雌、雄体者相似。本种与 *Corophium volutator* Gravelines 的区别在于雄体第 2 触角第 4 柄节末端齿强壮并具小的内侧瘤突, 尾节末端凹入等。

(104) 香港螺贏蜚 *Corophium hongkongensis* Hirayama, 1986 (图 123)

*Corophium hongkongensis* Hirayama, 1986a: 461, fig. 7.

**标本采集地** Hirayama(1986)报告采自香港大鹏湾西侧, 水深 9m, ♀ 标本体长 4.0mm。

**形态描述** 头部额角三角形, 达侧头叶的顶端, 尾部 4~6 腹节愈合, 背面观呈圆形, 雌体第 2 触角第 4 柄节细, 末端无齿状突出, 大颚触须第 2 节处于第 1 节的中部。第 2 腿足指节腹缘具 1 附加齿, 第 3、4 步足指节长于腕节与掌节之和, 第 3 尾肢柄不向外扩展, 并长于分肢。

**生态习性** 本种栖息水深 9m, 底质为软泥。

**地理分布** 南海。

(105) 隐居螺贏蜚 *Corophium insidiosum* Crawford, 1937 (图 124)

*Corophium insidiosum* Crawford, 1937: 615, fig. 2a~g. —Nagata, 1960: 177. —Lindolin, 1979: 530, fig. 254d~h. —Hirayama, 1984a: 14, fig. 51. —1986a: 480. —Barnard et Karaman, 1991a: 18. —Ren, 1992: 241, fig. 16. —Yan et al, 1998: 27.

**标本采集地** 大连、青岛、即墨、台湾和 Hirayama(1986)报告标本采自香港大鹏湾平洲, 318 个标本。♂ 体最大体长 5.5mm, ♀ 体最大体长 4.5mm。

**形态描述** 体躯背腹略扁, 腹部 4~6 节愈合, 第 1 尾肢处呈最初缺刻, 尾节梯形, 中间具 1 凹沟。雄体较健壮, 头部额角长, 矛状, 几乎达第 1 触角第 1 柄节中部, 侧叶钝尖, 眼小。第 1 触角几乎为体长的 1 半, 第 1 柄节较粗壮, 基部具明显的疣突, 第 2 柄节较细, 第 3 柄节细短, 鞭短于柄, 9~10 节, 第 2 触角强壮, 柄部显著大于鞭部, 第 5 柄节细长, 第 4 柄节粗壮, 具 2 腹刺, 3 节。雌体头部额角小, 钝尖, 第 1 触角柄部较长于鞭, 第 1 柄节较粗壮, 低缘具 4 刺, 基部刺最小, 内缘具 3 直立刺, 第 2 柄节较细, 第 3 柄节最短, 鞭 4~6 节。第 2 触角第 5 柄节稍短于第 4 柄节, 下缘中部具 1 刺, 第 4 柄节较粗壮, 具 2 对刺和 1 末端刺, 第 3 柄节具 1 对刺, 2~3 节, 末端具 2 爪状刺。大颚触须 2 节, 第 2 节细长, 节的末端各具 1 长刚毛。第 2 腿足指节腹缘具 4 齿。第 3、4 步足基节和长节较宽, 第 3 尾肢柄节方形, 单肢, 半圆形。

**生态习性** 本种主要分布于北温带和热带浅水, 现有标本采自附着物试板或粗砂泥底, 栖息于泥管中。在大连潮间带和潮下带均有分布, 冬季密度较高。