

**(138) 长鞭壳颚钩虾 *Chitinomandibulum longiflagellatus* (Ren, 1992) (图 137)**

*Caviplaxus longiflagellatus* Ren, 1992: 292, fig. 49.

**标本采集地** 辽东湾、胶州湾。6♂♂, 最大体长 5.2mm; 3♀♀, 最大体长 5.2mm。

**形态描述** 体躯较小, 头部大, 额角尖而下弯, 长达第 1 触角第 2 柄节中间, 侧叶尖, 眼大, 在头背中部愈合。第 1—6 胸节短, 第 7 胸节长。第 1—3 腹节宽阔; 后背缘向后突出, 具褐色色素, 后腹角圆。第 4 腹节中部略凹, 第 5、6 腹节短。尾节卵圆, 后缘拱或稍凹。

雄体第 1 触角短, 大约为第 2 触角长度的 1/3, 第 1 柄节较长于第 2 及第 3 柄节, 鞭长于柄, 11 节, 基部第 1 节延长。雄体第 2 触角长, 约为体长的 1.5 倍, 第 5 柄节细, 第 4 柄节短, 两者前缘都具细短刚毛组, 鞭细长, 丝状, 约为柄长的 2 倍, 50 节, 节之长度大于宽度。雌体第 1 腿足短, 第 1、2 柄节几乎等长, 第 3 柄节约为第 2 柄节长度的 1/2, 鞭 5 节。雌体第 2 触角明显短于雄体第 2 触角, 鞭 6 节。

大颚切齿和动颚片发达, 白齿不明显, 触须长, 3 节。颚足内板小, 外板具内缘刺, 触须 4 节。

第 1 腿足底节板末端宽阔, 腕节后叶细长, 超过掌角, 掌节卵圆, 掌缘拱, 具细刺, 掌角具 1 刺, 指节爪状。第 2 腿足细长, 鳖状, 基节细, 腕节和掌节结合, 腕叶突出超过掌角, 掌缘具短刺, 指节活动指形。

第 3 步足底节板小, 下缘内凹, 具明显缺刻, 指节等于掌节之长度, 披针形。第 5、6 步足底节板宽阔, 指节小。第 7 步足最长, 基节梯形。

尾肢分肢较短于柄, 外肢略短于内肢, 两者相对缘具小刺排。

**生态习性** 本种栖息于温带浅海, 现有标本采自辽东湾和胶州湾水深 5—19m, 底质为软泥或砂泥, 多出现于夏季, 最大密度为 20 个/m<sup>2</sup>。常与 *C. jiaozhouwanensis* (Ren) 在一起。

**地理分布** 渤海、黄海(中国近岸)。

**分类讨论** 本种与 *C. jiaozhouwanensis* (Ren) 的区别在于雄体第 2 触角长于体躯, 丝状, 第 4、5 柄节前缘具 1 排细短刚毛组, 鞭节长度大于宽度等。

## 54. 香港小钩虾属 *Hongkongvena* Hirayama, 1992

*Hongkongvena* Hirayama, 1992: 140.

Type species: *Hongkongvena memoria* Hirayama, 1992.