

腹部第1—3节的后腹角几乎为方形，有小尖突。尾节宽而短。触角短小，第1触角稍强壮，柄部第1节较粗，第3柄节短，鞭短于柄，7节，副鞭很小。第2触角细弱，第5柄节略短于第4柄节，鞭短，6节。

第1底节板略小，末端稍宽，第2—4底节板宽阔，第5、6底节板分为前后两叶。第1腮足螯状，基节中部较宽，座、长节短小，腕节基部较宽，有尖而突出的后叶，与掌节形成螯状，内缘具小刺，掌节较窄长，内缘具小刺，指节爪状，内弯。第2腮足强壮，亚螯状，基节较窄长，座、长节短，腕节具突出的后叶，附在掌节基部腹缘，具短刚毛；掌节卵圆，掌缘无明显界缘，上部具小齿；指节长而弯。第3、4步足简单，第5—7步足基节卵圆、宽阔，后下角钝圆，长节末部稍宽。第1尾肢稍长于第2尾肢，第2尾肢外肢较短。

生态习性 本种栖息于热带和温带海域浅水。

地理分布 中国；日本，美国(加利福尼亚)。

分类讨论 本种与 *Leucothoe (Leucothoe) spinicarpa* (Abildgaard) 很相似。区别在于本种第1腮足基节中部宽，第2腹节后腹角方形，尾节宽而短。

(34) 鱼狗白钩虾 *Leucothoe (Leucothoe) alcyone* Imbach, 1967 (图 33)

Leucothoe alcyone Imbach, 1967: 78, pl. 20. —Baranard et Karaman, 1991a: 410.

标本采集地 香港，南海 $12^{\circ}12'50''N, 109^{\circ}12'45''E$ ，3个体，雄体体长3.0mm。

形态描述 额角短，延伸到第1触角第1柄节长度的2/7，大颚触须第3节大约等于第2节长度的2/5。第4底节板后末边几乎直。第1腮足腕节前边大约等于掌节长度的2/3，指节短于掌节长度的1/5；第2腮足的掌近指节基部具2小突出，掌角具1强齿。第3腹节后腹角尖，上弯，并具2小齿。尾节长为宽的2倍。

生态习性 本种栖息于热带水域浅海。

地理分布 南海(中国近岸)。

(35) 德鱼狗白钩虾 *Leucothoe (Leucothoe) germanalcyone* Hirayama, 1992 (图 34)

Leucothoe germanalcyone Hirayama, 1992: 111, figs. 1—4.

标本采集地 香港，3♀♀，体长6.0—7.0mm (Hirayama, 1992a)。

形态描述 额角短，下弯。眼大而圆。第2腹节后腹角具尖齿，第3腹节后腹角弯曲，具2齿，齿之上半圆形弯曲。第5、6腹节背面凹，具侧脊。尾节三角形，长为宽的2.6倍，末端尖。第2—6胸节具鳃，第2—5胸节具附卵片。

两触角等长。第1触角第1—3柄节长度比例4:4:1，鞭节具感觉刚毛。第2触角第3柄节具末端刺，第4、5柄节长度之比近5:3，鞭5节，为柄节长度的0.7倍。