

眶后头胸甲长 3 mm。

共栖宿主: 腔肠动物棘海鳃属 *Pteroeides*、*Scleroblemnon*、沙笮属 *Virgularia*。

分布: 海南岛; 桑给巴尔港, 印度尼西亚马卡撒海峡, 最大水深记录 50 m。

(80) 共生尖腹虾 *Dasycaris symbiotes* Kemp, 1922 (图 87)

Dasycaris symbiotes Kemp, 1922: 240~244, figs. 76~77, pl. 9, type locality: Off east coast of India and Mergui Archipelago. Müller, 1993: 24, full synonymy. —Li, 1997: 230, fig. 6, Beibu Bay, northern South China Sea, record from Chinese waters. —Li, 2000: 44, fig. 45, full synonymy. —Bruce, 2003: 216.

鉴别特征: 额角背缘及延伸到头胸甲部分通常具 6 齿, 各齿不明显宽而侧扁, 额角基部不呈明显鸡冠状; 头胸甲背甲侧面观呈齿状, 齿宽而尖; 眼角膜半圆形, 无乳头状小突起; 成体雌虾第一腹节、通常还有第二腹节的侧甲边缘圆, 第三至五腹节侧甲尖锐突出; 尾肢外肢可动侧刺之外具 1 强壮固定齿。

共栖宿主: *Pteroeides* 属石笔海胆。

分布: 北部湾、西沙群岛; 印度东岸, 墨吉群岛, 缅甸, 印度尼西亚, 新喀里多尼亚。




图 87 共生尖腹虾 *Dasycaris symbiotes* Kemp

a. 头胸甲和腹部侧面观 carapace and abdomen, lateral view; b. 右眼 right eye; c. 第二步足大螯 major (left) second pereopod; d. 第二步足大螯螯指 same, fingers; e. 第三步足 third pereopod (right); f. 尾节 telson. 标尺 Scale = 2mm (a, c); 1mm (b, d, e); 0.5mm (f). (仿 Li, 1997;

230, fig. 6)

(81) 桑给巴尔尖腹虾 *Dasycaris zanzibarica* Bruce, 1973 (图 88)

Dasycaris zanzibarica Bruce, 1973a: 247, figs. 1~6. Type localigy: Zanzibar. —Müller, 1993: