

共栖宿主：海百合。

分布：南海北部、海南岛；苏禄群岛，菲律宾，印度尼西亚，澳大利亚大堡礁，新喀里多尼亚。

(128) 安波岩虾 *Periclimenes amboinensis* (De Man, 1888) (图 130)

- Anchistia amboinensis* De Man, 1888a: 546, pl. 22a, fig. 2, type locality: Amboina, Indonesia.
Periclimenes amboinensis: Borradaile, 1898: 383. - Müller, 1993: 69, full synonymy. - Jeng, 1998: 111, color illustration, Taiwan, record from Chinese waters. - Minemizu *et al.*, 2000: 63, color figs. - Li, 2000: 153, fig. 187, full synonymy. - Bruce, 2003: 228.
Periclimenes (Corniger) *amboinensis*: Borradaile, 1917: 366.
Periclimenes (Ancylocaris) *amboinensis*: Kemp, 1922: 172.
Periclimenes (Harpilius) *amboinensis*: Holthuis, 1952c: 50.

鉴别特征：头胸甲和腹部侧面体表光滑无麻点。额角不伸过第二触角鳞片，指向前下方，齿式 0 + 6/1，最后背齿与其余各齿不分离，明显位于眼眶上方之前，侧脊后部扩展为眼上檐及眼上刺。头胸甲具眼上刺，肝刺不明显大于触角刺，位于后者稍后下方，伸近头胸甲前缘；眼眶下角锐，非卵圆形。尾节后缘之前无背侧刺。眼角膜非半球形，端部渐呈角状突出。第一触角柄基节具 1 个端侧刺；第二触角鳞片长为宽的 4 倍，侧缘稍内凹，端侧齿不伸至鳞片末端。第四胸节腹板无细的中突。第一步足整个螯伸过第二触角鳞片末端；左右第二步足大小不等，螯指约为掌部的 2/3，腕节远短于掌部的 1/2，不长于其端部直径，无端刺，长节折缘具粗的端齿；第三步足指节折缘无齿状突起，亚端部不平截，但呈模糊的双爪状，折缘波形内凹，掌节折缘近端部具不明显的刺，不分亚节；尾肢很少伸过尾节末端。最大眼眶后头胸甲长约 4 mm。

共栖宿主：栉羽星类海百合棘皮动物。

分布：台湾；琉球群岛，印度尼西亚，澳大利亚大堡礁，马绍尔群岛。

(129) 短腕岩虾 *Periclimenes brevicarpalis* (Schenkel, 1902) (图 131)

- Ancylocaris brevicarpalis* Schenkel, 1902: 563, pl. 13, fig. 21, type locality: Makassar, Celebes, Indonesia.
Palaemonella aberrans Nobili, 1904: 233, type locality: Jibuti.
Periclimenes potina Nobili, 1905: 159, type locality: Arabia.
Harpilius latirostris Lenz, 1905: 380, pl. 47, figs. 14~14c, type locality: Zanzibar, Kokotoni, Bawi.
Periclimenes hermitensis Rathbun, 1914: 655, pl. 1, figs. 1~3, type locality: W. Australia.
Periclimenes (Ancylocaris) *brevicarpalis*: Kemp, 1922: 185, figs. 40~42, pl. 6, fig. 8. - Yü, 1936b: 91, Haikou, Hainan Island, record from Chinese waters.