




图 122 尖顶滑鸟蛤 *Laevicardium attenuatum* (Sowerby)

标本采集地 南海，海南万宁外海 (图 124)。1 个标本。

地理分布 台湾和南海；印度洋的莫桑比克，桑给巴尔，肯尼亚，斯里兰卡；太平洋的日本，菲律宾，澳大利亚，斐济。

生态习性 标本是采自水深 32m 处的中砂底质，数量较少。

(93) 脆壳滑鸟蛤 *Laevicardium lobulatum* (Deshayes, 1854) (图 123)

Cardium lobulatum Deshayes, 1854: 332.

Cardium (Laevicardium) lobulatum Deshayes: Lynge, 1909: 260, pl. 5, figs. 16–19.

Laevicardium lobulatum (Deshayes): Habe, 1962: 128, pl. 57, fig. 20; 1977: 172; Fischer-Piette, 1977: 24; Wu, 1980: 128; Xu, 1991: 163; 1997: 134; Bernard *et al.*, 1993: 72.




图 123 脆壳滑鸟蛤 *Laevicardium lobulatum* (Deshayes) × 2 (仿 Lynge, 1909)

鉴别特征 壳中等大，壳质薄脆，两壳膨胀，壳向后腹面方向延伸，略呈斜卵圆形；壳顶突出，前倾，位于背部中央之前；前后背缘均微凸，前缘圆，后端略尖；壳面白色，遍布红黄色云斑；放射肋弱，以前、后部较明显；同心刻纹很细，同放射肋相交，形成不十分明显的格子状刻纹。




图 124 尖顶滑鸟蛤 *Laevicardium attenuatum* (Sowerby) (●)
脆壳滑鸟蛤 *Laevicardium lobulatum* (Deshayes) (◐) 在中国海的分布

壳内面也能看到透过贝壳表面的刻纹和颜色，各种肌痕不明显；内缘齿状缺刻也以前后较明显。

右壳 2 个主齿大小近相等，前侧齿为发育不全的双齿型；左壳前主齿较大；外韧带较长，前端近壳顶处特别突出。

标本测量 (mm)	壳长	壳高	壳宽
	17.8	17.4	10.4

标本采集地 南海南沙群岛水域 111°50'E, 3°45'N (图 124)。

地理分布 台湾和南海北部；日本奄美，菲律宾，泰国湾，澳大利亚的昆士兰和马尔代夫—拉加代夫群岛。

生态习性 过去记录它们垂直分布为 0—20m 的水深，标本采自水深 50m 处。