

(68) 柏氏糙鸟蛤 *Trachycardium beauforti* (Prashad, 1932) (图 93)

Cardium beauforti Prashad, 1932: 270, pl. 6, figs. 27, 28.

Trachycardium beauforti (Prashad): Bernard *et al.*, 1993: 69.

Acrosterigma beauforti (Prashad): Lamprell *et Healy*, 1998: 244, pl. 245, fig. 788.

鉴别特征 贝壳中等大，壳质较厚而坚硬，两壳较膨胀，前、后近对称；壳顶尖，前倾；前背缘微凸，后背缘近平直；壳表面颜色深，有褐色云斑；放射肋约 38 条，仅后部的肋上有小结节，其他肋上光滑；肋间沟狭窄。




图 93 柏氏糙鸟蛤 *Trachycardium beauforti* (Prashad)

壳内面土黄色；闭壳肌痕和外套肌痕不明显；内缘锯齿状。

铰合部短，弓形；左壳前主齿圆锥形，较强大，后主齿退化，很小，前后侧齿各 1 个。

标本测量 (mm)	壳长	壳高	壳宽
	23.8	29.5	10.0 (左壳)

标本采集地 南沙群岛。1 片左壳 (图 90)。

地理分布 南海；澳大利亚，印度尼西亚。

讨论 Fischer-Piette 认为本种是黄边糙鸟蛤 *T. flavum* (Linnaeus) 的同物异名，但本种的壳型特别宽，壳高的比例也较大，放射肋的数目也较多，以上各点的差异足以证明 Fischer-Piette 的意见是不能成立的。

生活习性 不详。