


图78 异羽蛛 *Ozyptila inaequalis*

A. 外雌器, B. 同上, 内面观; C. 雄蛛左触肢器腹面观, D. 同上, 外侧观

到前侧眼, 只能看到一部分前中眼, 前侧眼位于前中眼的外侧上方。后眼列微后凹, 后侧眼朝向外后方。后中眼朝向上方。前侧眼最大, 前中眼、后中眼依次稍小。前中眼间距大于前中侧眼间距, 后中眼间距等于后中侧眼间距。中眼域宽略大于长 (0.61:0.58), 前后边等长 (0.58)。前两对步足腿节背面中部显著隆起, 因而显得粗壮。第1足胫节下方2对刺, 后跗节下方3对刺。腹部后端三分之一处最宽, 宽度稍大于长度。

雄蛛长3.96毫米。头胸部较雌蛛的略扁。除前列眼外, 后列眼均在眼丘上, 眼丘较雌蛛的明显。第1足腿节膨大较明显, 第2足腿节不明显。第1足胫节和后跗节下方的刺数同雌蛛。步足上除褐色斑外, 有较多的黄色或色部位。腹部背面主要为白色, 有一些黑褐色斑, 另在中部有一对黑色横纹, 自中线两侧向两侧伸展, 因稍倾斜, 故略成“八”字形 (这一斑纹在雌蛛亦有, 因雌蛛腹背的底色黄褐, 较不明显)。

分布: 内蒙古、甘肃、山东。

日本羽蛛 *Ozyptila nipponica* Ono, 1985 (图79)

Ozyptila nipponica Ono, 1985: 29—32, figs. 26—32; 1988: 126—127; Tang & Song, 1988: 14, figs. 2. K, L.

雄蛛长2.00毫米。头胸部梨形, 宽稍大于长。背甲褐色, 密被匙状毛。前眼列微后凹, 后眼列强烈后凹。眼丘白色。背甲中央浅色带不明显。螯肢、下唇和颚叶褐色。胸板黑褐色。步足上有许多棒状毛。腹部宽大于长, 背面黑褐色, 有橙色斑块, 密生匙状毛。触肢胫节




图79 日本羽蛛 *Ozyptila nipponica*

A. 雄蛛左触肢腹面观, B. 同上, 外侧观

的外侧突基部粗大, 末端趋尖; 腹突起较短, 末端略呈拳状。生殖球圆形, 无中突, 插入器细长。

分布: 安徽 (黄山); 日本。

隆革羽蛛 *Ozyptila nongae* Paik, 1974 (图80)

Ozyptila nongae Paik, 1974: 123—125, figs. 2, 9—13, 23; Tang & Song, 1988: 14, figs. 2. M, N.




图80 隆革羽蛛 *Ozyptila nongae*

A. 外雌器, 外面观, B. 同上, 内面观