




图117 角红蟹蛛 *Thomisus labefactus*

A. 雌蛛, B. 外雌器, C. 同上, 内面观;
D. 雄蛛, E. 左触肢器腹面观 (仿 Ono, 1988)

分布：我国河北、新疆、甘肃、山东、山西、河南、湖北、四川、云南、安徽、浙江、福建、广东、台湾等省区；朝鲜，日本。

冲绳蟹蛛 *Thomisus okinawensis* Strand, 1907 (图 118)

Thomisus okinawensis Strand, 1907: 202; Ono, 1988: 203—207, figs. 215—224.

Thomisus formosae: Strand, 1907: 204.

Thomisus formosae: Mello-Leitao, 1929: 310.

Thomisus okinawaensis: Yaginuma, 1977: 397.

雌蛛长7.00—11.55毫米。头胸部长宽约相当，黄到黄褐色，在胸区两侧有一对深褐色斑。眼大小相仿，前侧眼最大。前中眼间距小于中侧眼间距，后中眼间距大于中侧眼间距。中眼域宽远大于长(1:0.43—0.54)，后边大于前边(1:0.54—0.62)。额宽大于前中眼间距(1.40—1.85:1)。下唇和胸板均长大于宽。足式：2, 1, 4, 3。腹部通常长大于宽，白到黄白色，有3对黄至米色的、并包以黑边的斑块分布于背面的两侧。外雌器中部有一小骨化板，插入孔在板上。插入管短；纳精囊大，卵形。

雄蛛长2.44—3.05毫米。头胸部黄褐色，无斑纹。螯肢黄褐色，中部有一隆起。颚叶、下唇和胸板暗黄色。胸板长宽约相当。触肢胫节的腹突宽而短；间突往外侧伸展，粗大；后侧突发达。生殖球简单，隆起；插入器丝状，较角红蟹蛛的短。第1足最长。足式：1, 2,




图118 冲绳蟹蛛 *Thomisus okinawensis*

- A. 雌蛛, B. 外雌器, C. 同上, 内面观 (A—C, 日本 *Th. okinawensis* 的正模);
 D. 雌蛛, E. 外雌器 (D—E, 台湾 *Th. formosae* 的正模); F. 雄蛛,
 G. 头胸部前面观, H. 左触肢器腹面观, I. 同上, 外侧观, J. 雄蛛触肢胫节背面观
 (F—J, 白色标本) (仿 Ono, 1988)

4, 3. 腹部黄白到黄褐色。

分布: 我国台湾; 日本, 泰国。

附注: Strand 在1907年同时描述二个新种, 即冲绳的 *Th. okinawensis* 和台湾的 *Th. formosae*, 但并无特征描述。Ono (1988) 在镜检了这两种的正模标本 (均系雌蛛) 后, 认为尽管其外形有很大差异, 但生殖器内部结构相同, 应为同种, 故把台湾蟹蛛作为冲绳蟹蛛的异名。笔者暂采取 Ono 的意见, 并把这雌蛛的两种形态的附图录此, 以供今后研究时参考。Ono 同时补充记述了雄蛛的特征。