

分布：云南。

云晦姬蝽 *Phorticus yunnanus* Hsiao, 1981 (图 107, a, b)

*Phorticus yunnanus* Hsiao, 1981, Act Ent. Sinica, 24 (1): 64—65, 70, fig. 4.

*Phorticus yunnanus* Hsiao, 1981 Hsiao et Ren, 1981, A Handbook for the Determination of the Chinese Hemiptera-Heteroptera, 2: 541, pl. 82, fig. 795.

体黄色，被有黄色半直立毛。头、前胸背板后叶两侧、小盾片、前翅革片中部及膜片、触角、喙及中胸腹板均为褐色。前翅翅脉色较深，腹部腹面色泽浅于体背面，但略着褐色。

雌虫体长 3.2mm，腹部宽 1.13mm，头长 0.33mm，头宽 0.4mm，头顶宽 0.17mm。触角第 3—4 两节显著细于 1—2 两节，第 2 触角节由基部向端部逐渐加粗，触角各节长度为 I : II : III : IV = 0.2 : 0.33 : 0.3 : 0.37mm。前胸背板的领与前叶分界不明显，前胸背板长 0.87mm，前叶具隐约印纹，背板前叶长 0.57mm (包括领长度)，前角间宽 0.37mm，侧角间宽 1.1mm。前翅长 2.03mm，仅达腹部末端。前足基节长 0.37mm，股节长 0.8mm，粗 0.3mm，中央腹面扩展成齿突起，突起以后具一系列黑色小刺；前足胫节长 0.6mm，腹面具两列黑色小刺，端部膨大，具海绵窝。中足股节长 0.7mm，腹面无黑色小刺，不特别粗，胫节稍短。后足股节长 0.93mm，胫节长 0.9mm，跗节长 0.33mm (各节长度比为 1 : 4 : 5)。后足股节略长于胫节 (0.93mm : 0.9mm)。后胸臭腺沟缘宽阔 (图 107b)。腹部长 1.67mm。

本种与印度产的 *Phorticus varicolor* Distant 接近，但花纹颜色较浅，触角各节长比例不同；同时后胸臭腺沟缘的外形与分布在印度的一个种 [*Phorticus abdominalis* Harris (短翅型)] 很相似。

观察标本：云南 (景洪, 550m, 1957. IV. 8)。

分布：云南。

狄氏晦姬蝽，新种 *Phorticus distanti* Ren, sp. nov. (图 108, a, b, c)

体褐色，具短刚毛及稀疏长毛。头背面的前半部、头腹面中央纵纹、触角第 3—4 节 (除第 1—2 两节色较深)、喙各节及各足均为淡黄色，小盾片、前翅基部暗黄色，头背面后半部黑褐色，眼红褐色，前胸背板前叶淡黄棕色，后叶褐色；腹部背板各节棕色。触角第 1 节短，不达头的前端，第 1—2 节较粗于 3—4 两节。前胸背板侧缘弯曲，后缘略向后弯。小盾片侧缘显著弯曲，基域有两个圆形小凹窝，末端呈短锥状。前足胫节向前渐加宽，其前端的宽度略狭于股节中域的宽度，前足股节的腹面及胫节的内侧均无刺列构造。腹部的背板较光亮，各节表面均具显著的浓密浅刻点。