

图 123 长胸花姬蝽 *Prostemma longicolle* Reuter

后胸臭腺域 (示臭腺沟缘)

图 123a 长胸花姬蝽 *Prostemma longicolle* Reuter

雌虫腹部第VII腹板中突

图 123b 黄翅花姬蝽 *Prostemma kiborti* Jakovlev

后胸臭腺域 (示臭腺沟缘)

雌虫体长 9.5mm，腹部宽 3.4mm。由背面观察，头长 1.2mm，头宽 1.4mm，头顶宽 0.5mm；由侧面观察，头长 1.7mm，眼前部分：眼：眼后部分 = 0.7 : 0.7 : 0.3mm。触角第 1 节略短于第 2 节 (0.5 : 1.6mm)，第 3 节略长于第 2 节 (1.7 : 1.6mm)。喙各节长度为 I : II : III : IV = 0.3 : 0.9 : 1.0 : 0.4mm。前胸背板长 2.4mm，后叶具稀疏小刻点，前角间宽 0.9mm，侧角间宽 2.4mm。前翅长 2.0mm，超过小盾片顶端 0.5mm。后胸臭腺沟缘前半部不明显向内弯，后中部外缘呈圆形 (图 123a)。第 VII 腹板中突短，为该节长的 1/2 (图 123b)，生殖腔具一个大骨化环。

观察标本：陕西 (华县, 1981. IV. 16; 甘泉清泉镇, 1971. V. 5, 杨集昆; 谓南, 1981. V. 1, 王丰贤), 甘肃 (庆阳, 1933. V. 2)。

分布：陕西、甘肃、江苏。

平带花姬蝽 *Prostemma fasciatum* (Stal, 1873) (图 14, 图 19, 图 29; 图版 IX, 图 D)

Prostemma fasciatum Stal, 1873, En. Hem. II, p. 108.

Prostemma fasciatum (Stal), Miyamoto, 1964, Kontyu, 32 (2): 275.

Prostemma fasciatum (Stal), Hsiao et Ren, 1981, A Handbook for the Determination of the Chinese Hemiptera-Heteroptera, 2: 544, pl. 82, fig. 804.

体黑棕色，具白色斑，被有深色长毛及短柔毛。前胸背板后叶、小盾片及前翅基半

部暗橘红色，前翅革片中部横纹斑及端角、膜片端部淡黄色或白色。各足黄色，前足股节基半部2/3、中足及后足股节中域的宽环斑均为褐棕色。

雄虫体长6.7mm，腹部宽2.1mm。前翅长3.7mm，几达腹部末端。抱器弯刀状，前半部较明显窄于基半部。生殖节的艾氏器由丛生的刚毛组成的刚毛列。

雌虫体长7.0mm，腹部宽2.4mm。由背面观察，头长0.7mm，头宽0.9mm，头顶宽0.4mm；由侧面观察，头长1.2mm，眼前部分：眼：眼后部分=0.5：0.5：0.2mm。触角各节长度为I：II：III：IV=0.35：0.9：0.8：0.72mm。喙各节长度为I：II：III：IV=0.3：0.5：0.6：0.3mm。前胸背板长1.6mm，前角间宽0.7mm，侧角间宽2.2mm；背板前叶显著长于后叶(1.0：0.6mm)。前翅长4.7mm，略超过腹部末端。前足股节长于胫节(1.6：1.1mm)，粗0.7mm。后胸臭腺沟缘狭窄，呈角状弯曲，但略小于直角，前半部狭于基半部(图29)。

本种接近于角带花姬蝽 *Prostemma hilgendorffi* Stein，但前翅色斑形状不同，小盾片一色橘黄色，各足非一色(前足股节基半部褐色，中、后足股节中部具褐色环斑)，后胸臭腺沟缘形状明显相异。

观察标本：福建(莆田，1985. VI. 26；邵武、沙县)，广东(广州东山，1957. VI. 5；广州，1964. V.，灯诱)，广西(雁山，1961. VI. 30，刘思孔)。

分布：福建、台湾、广东、广西；日本，菲律宾，印度尼西亚，爪哇。

角带花姬蝽 *Prostemma hilgendorffi* Stein, 1878(图14, 图31, 图124—图126, 图127—图130; 图版V, 图A, B; 图版IX, 图C)

Prostemma hilgendorffi Stein, 1878, Berlin, Entomol. z. Jg. 22, H. 2, s. P. 378.

Prostemma hilgendorffi Stein, Hsiao et Ren, 1981, A Handbook for the Determination of the Chinese Hemiptera-Heteroptera, 2: 544, pl. 82, fig. 803.

Prostemma hilgendorffi Stein, Kerzhner, 1981, Fauna USSR. Fam. Nabidae, 13 (2): 96—113.

Prostemma hilgendorffi Stein, 1992, Ren, An Iconography of Hemiptera-Heteroptera Eggs in China, p. 82—83, textfig. 61, pl. 61, figs. A, B, C, D).

体黑色，具橘红色、黄色及灰白色斑，被有黑褐色刚毛及浅色亮长毛。触角及足黄褐色，前胸背板后叶、小盾片(除基部黑色外)端部2/3及前翅基半部浅红棕色或橘红色；前翅中部具呈三角状淡色斑，端半部黄色或淡黄色斑块，膜片小；后胸侧板及臭腺域暗黄色，臭腺沟缘光亮、较宽、中部弯几呈直角状；各足股节及胫节具刺列，刺为黑色。

雄虫体长6.2mm，腹部宽2.4mm，由侧面观察，头长0.9mm；由背面观察，头长0.8，头宽0.9mm，头顶宽0.4mm。触角第1节为头长的1/2，各节长度为I：II：III：IV=0.4：0.8：0.9：0.8mm。喙粗壮，喙各节长度为I：II：III：IV=0.25：0.4：0.5：