

雌虫体长 5.7mm，腹部宽 2.4mm。前翅长 4.0mm，略超过腹部末端。

体长 4.7—5.7mm，腹部宽 1.9—2.4mm。

观察标本：海南（吊罗山，1964. III. 26，刘胜利；吊罗山，1964. III. 26，刘思孔），云南（勐海南糯山，1 200—1 300m，1957. IV. 24）；越南（河内）。

分布：海南、云南；马来西亚，越南。

台湾光姬蝽 *Rhamphocoris elegantulus* (Schumacher, 1914)

Aristonabis elegantulus Schumacher, 1914, Ent. Rundsch. 31 (14): 79.

Rhamphocoris elegantulus Schumacher, Hsiao et Ren, 1981, A Handbook for the Determination of the Chinese Hemiptera-Heteroptera, 2: 541.

头、前胸背板及各足朱红色，触角第 1 节橘黄色；第 2 节粗，呈黑色；第 3—4 两节细，具直立刚毛。小盾片黑色，无光泽；前翅革片的尖端红色；膜片黑色，具淡黄色的窄缘，此淡黄色缘位于革片之后方。腹部红色，中、后胸腹板、第 1 腹板及最后一节腹板背面的斑均为黑色。

分布：台湾。




图 111 图 112 后胸臭腺域（示臭腺沟缘）

图 111 红盾光姬蝽 *Rhamphocoris borneensis* (Schumacher)

图 112 黑头光姬蝽 *Rhamphocoris hasegawai* (Ishihara)

黑头光姬蝽 *Rhamphocoris hasegawai* (Ishihara, 1943) (图 112)

Nabis hasegawai Ishihara, 1943, Mushi, 15: 63.

Rhamphocoris hasegawai (Ishihara) Hsiao et Ren, 1981, A Handbook for the Determination of the Chinese Hemiptera-Heteroptera, 22: 542, textfig. 1670, 1671, pl. 82, fig. 797.