

Nolaseniola Strand, 1920, Arch. Naturg. 84 (A) 12: 141.

Isatoolna Nye, 1975, Lep. Cat. Noct. 1: 260.

喙发达，下唇须斜向上伸，第二节前缘饰毛较宽，第三节小，额平滑无突起，有毛簇，雄蛾触角线形，胸部和腹部被鳞片，前翅顶角约呈方角形。

种 检 索 表

前翅外带在亚中褶内突成一灰白斑 横带钝夜蛾 *Acantholipes trajectory*
前翅外带直斜，无灰白斑 钝夜蛾 *A. regularis*

横带钝夜蛾 *Acantholipes trajectory* (Walker) (图版 LXIII-13)

Euclidia trajectory Walker, 1865, List Spec. Lep. Colln Br. Mus. 33: 986. (未注明模式产地)

Acantholipes inconspicua Butler, 1880, Proc. zool. Soc. fig. 677.

Acantholipes trifasciata Moore, [1885] 1884—1987, Lep. Ceyl. 3: 187.

Acantholipes trajectory: Hampson, 1894, Fn. Br. Ind. 2: 521. ——Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 372.

翅展 23 mm。头部暗褐色，下唇须第一节灰白色，第二节外侧基部灰白色，约呈三角形，其余黑色；胸部暗褐色，下胸与足灰白色杂少许褐灰色；前翅暗褐灰色，前缘区布有黑褐细点，后缘区中部及翅外半部黑灰色，内线黑色外弯，中室前不显，中脉后内斜，肾纹为棕色窄条，中线黑色，自肾纹后端内弯至翅后缘，外侧色较黑，一黄褐色内斜窄带自顶角达翅后缘，内侧在亚中褶处有一灰白色斑，其内端黑色；后翅基部暗褐灰色，其余褐灰色带黑色，中线黑色，模糊，外线为一黄褐色粗线，自中褶至翅后缘；腹部褐黑色。

寄主 三叶豆。

分布 台湾、广东、海南；印度，斯里兰卡。

钝夜蛾 *Acantholipes regularis* (Hübner) (图版 LXIII-14)

Noctua regularis Hübner, [1813], Samml. Eur. Schmett. 4: pl. 128, fig. 588. (欧洲)

Acantholipes regularis: Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 3: 385. ——Draudt, 1936, in Seitz, Macrolep. World 3 Suppl.: 229. ——Chen, 1985, Econ. Ins. Fn. China, Lep. Noct. 4: 144.

翅展 25 mm。头部灰褐色，额灰白色，下唇须第二节外侧有一黑褐斑，第三节基部黑褐色，端部白色；胸部背面灰褐色，杂有褐色细点，下胸灰白色，足外侧暗褐色杂灰白色，跗节各节间有白斑；前翅灰褐色，布有黑褐细点，中部有一不清晰的黑褐带，前段不显，自中室后向翅后缘内斜并扩展，肾纹黑色，隐约可见外围黄白色，外线黄白色，外侧衬黑褐色，自前缘脉后较直内斜，后端微外伸，外线外方区域色较暗，翅外缘