

分布 江西、广东、海南、贵州、四川；日本。

阿夜蛾属 *Achaea* Hübner

Achaea Hübner, [1823] 1816, Verz. Bek. Schmett. p. 296.

Type-species: *Phalaena melicerta* Drury.

Geria Walker, 1858, List Spec. Lep. Colln Br. Mus. 14: 1366.

喙发达，下唇须向上伸，第二节约达头顶，额平滑，复眼圆大，雄蛾触角有纤毛；胸部毛鳞混生，无毛簇；前足及后足胫节有长毛，前足胫节无刺，中后足胫节有刺；腹基部几节有毛簇；前翅前缘端部拱垂，外缘曲度平稳，成波浪形，有副室；后翅中室约为翅长的1/3。

种 检 索 表

前翅内线外、线明显 飞扬阿夜蛾 *Achaea janata*
前翅内线、外线不明显 人心果阿夜蛾 *A. serva*

飞扬阿夜蛾 *Achaea janata* (Linnaeus) (图版LIII-13)

Phalaena Geometra janata Linnaeus, 1758, Syst. Nat. (Edn 10): 527. ("Indies")

Phalaena Noctua melicerta Drury, 1773 1770, Ill. exot. Ins. 1: 46.

Achaea melicerta: Gaede, 1938, in Seitz, Macrolep. World 11: 480. ——Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 354.

翅展51—54 mm。头、胸灰黄褐色；前翅浅灰褐色，基线黑色外斜，内线双线黑棕色波浪形，外斜，肾纹前、后端各一黑点，中线暗褐色波浪形，外线黑色，与中线近平行，内侧一暗褐窄带，亚端线灰白色波浪形，端线黑色；后翅棕黑色，基部灰褐，中部一楔形白带，外缘有三个白斑，臀角有一白窄纹。

寄主 蓖麻、飞扬草。

分布 山东、湖北、湖南、台湾、福建、广东、广西、云南；日本，印度，缅甸，南太平洋若干岛屿，大洋洲。

人心果阿夜蛾 *Achaea serva* (Fabricius) (图版LIII-14)

Noctua serva Fabricius, 1775, Syst. Ent. p. 593. (澳大利亚)

Achaea serva: Hampson, 1913, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 12: 521. ——Gaede, 1938, in Seitz, Macrolep. World 11: 480. ——Barlow, 1982, Moths SE Asia, p. 98. ——Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 354.

翅展62—80 mm。头、胸及前翅棕褐色，前翅内线黑棕色波浪形外斜，环纹为一

黑点，肾纹仅前、后端可见一黑点，中线黑棕色波浪形，外线黑棕色，后半波浪形内斜，亚端线隐约可见，端区色较浓；后翅棕黑色，中部一白条纹，顶角、外缘中部及近臀角处各一白斑；腹部暗灰色。

寄主 人心果。

分布 福建、广东、海南、云南；印度，缅甸，印度尼西亚，新加坡，大洋洲，非洲东部。

贊夜蛾属 *Ophisma* Guenée

Ophisma Guenée, 1852, in Boisduval et Guenée, Hist. nat. Ins., Noct. 3: 236.

Type-species: *Ophisma gravata* Guenée.

喙发达，下唇须向上伸，第二节约达头顶，额光滑无突起，复眼大，圆形，雄蛾触角线形，胸部主要被毛，无毛簇，雄蛾足胫节饰长毛，中足胫节具刺；前翅顶角尖，有一副室，后翅中室短，长约为翅之 $1/3$ ，5脉发达，自中室下角略前发出；腹部基部几节背面有毛簇。

贊夜蛾 *Ophisma gravata* Guenée (图版LIII-15)

Ophisma gravata Guenée, 1852, in Boisduval et Guenée, Hist. nat. Ins., Noct. 3: 237. (Indies Orientales)

Grammodes pallens Lucas, 1893, Proc. Linn. Soc. N. S. 2 (7): 260.

Ophisma gravata: Hampson, 1913, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 12: 542. ——Gaede, in Seitz, Macrolep. World 11: 481.

Parallelia gravata: Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 355.

翅展 58 mm。头部褐黄色，触角干基部白色；胸部背面赭黄色；前翅淡褐黄色，布有棕色细点，中线暗棕色，直线内斜，外线不清晰，暗褐色，微弯，中线与外线之间色较淡，亚端线模糊，锯齿形内斜，端线由一列黑点组成，缘毛微白；后翅淡黄色，微带黄色，亚端区有一黑棕色宽带，在2脉后窄缩；腹部淡褐黄色带灰色，腹面端部带赤褐色。

分布 江苏、浙江、湖南、江西、福建、海南、云南；锡金，印度，缅甸，马来西亚，新加坡。

巾夜蛾属* *Dysgonia* Hübner

Dysgonia Hübner, [1823] 1816, Verz, bek. Schmett. p. 269.

* 本属曾用 *Parallelia* 为学名。