

翅展 20 mm。头、胸及前翅绿黄色，前翅外线外方紫棕色，前缘脉有一列小黑斑，内线棕色衬黄白色，肾纹黄色黑边，外线黑色微波浪形，亚端线黄色不完整，端线为一列黑点；后翅黄色，端带褐黑色。雌蛾头、胸黑棕色；前翅黑棕色，前缘脉有一列黄点；后翅端带很宽，棕黑色；腹部各节间黄色。

分布 台湾、海南、云南；印度，缅甸，斯里兰卡，大洋洲。

大理石绮夜蛾 *Acontia marmoralis* (Fabricius) (图版 XLII-19, 20)

Phalaena marmoralis Fabricius, 1794, Ent. Syst. 3 (2): 234. (印度)

Acontia tropica Guenée, 1852, Hist. nat. Ins., Noct. 2: 217.

Tarache marmoralis: Hampson, 1910, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 10: 747. —Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 11: 301.

Acontia marmoralis: Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 333. —Sugi, 1982, in Inoue et al., Moths Jap. 1: 824.

翅展 23 mm。头、胸及前翅浅黄色，前翅带霉绿色，前缘内半褐色，基、内线霉绿色，后者似带状，环、肾纹褐灰色，中央灰白，一棕色宽带自顶角内斜，向后渐宽并渐暗，有蓝白细点；后翅浅黄色。雌蛾前翅不带霉绿色，后翅端区带较宽的褐色。幼虫灰色，各节有浅紫色条，背线由黄白点组成。

寄主 黄花稔。

分布 台湾、广东、海南、云南；印度，缅甸，斯里兰卡，印度尼西亚，非洲。

斜带绮夜蛾 *Acontia olivacea* (Hampson) (图版 XLII-21)

Cilix olivacea Hampson, 1891, Ill. Het. Br. Mus. 8: 9, 63, pl. 142, fig. 9. (印度)

Tarache olivacea: Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 11: 305.

Acontia olivacea: Sugi, 1982, in Inoue et al., Moths Jap. 1: 824.

翅展 20 mm。头部与颈板绿褐色，胸部白色带褐色；前翅基部与前缘区白色，前缘脉绿褐色，顶角区带有黄色，翅的其余部分绿褐色，外线粗，自中室外侧内斜至翅后缘，两侧微带黄色，翅外缘有一列新月形黑褐点，内侧有一白色波浪形线，缘毛白色带褐色；后翅绿褐色，缘毛端部白色；腹部褐白色。

分布 江苏、浙江；印度。

秉绮夜蛾 *Acontia nitidula* (Fabricius) (图版 XLII-22)

Bombyx nitidula Fabricius, 1787, Mant. Ins. 2: 126. (印度)

Phalaena catena Sowerby, 1805, Brit. Misc. 4: 29.

Tarache nitidula: Hampson, 1910, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 10: 768. —Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 11: 305.