

*Acronycta alni*: Hampson, 1909, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 8: 123.

*Acronicta alni*: Warren, 1909, in Seitz, Macrolep. World 3: 13, pl. 2g. —Kozhantschikov, 1950, Fn. SSSR, 12: 480, fig. 248. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 244, pl. 77, fig. 1765.

翅展 41mm。头部灰白色；胸部灰色，翅基片有黑纹；前翅灰白带黑褐，内、外线均双线黑色，基剑纹与端剑纹黑色，环纹白色黑边，肾纹深褐色黑边，亚端线白色；后翅白色，顶角稍黑，外线隐约可见；腹部灰白色。

**寄主** 桤木、桦、山毛榉、栎木等属。

**分布** 黑龙江、陕西、河南；日本，欧洲。

### 意剑纹夜蛾 *Acronicta edolatina* Draudt (图版 III-10)

*Acronicta edolatina* Draudt, 1937, Ent. Rdsch, 54: 398, pl. 4, fig. 2d. (云南丽江, 太白山)

*Acronycta edolatina*: Draudt, 1950, Mitt. munch. ent. Ges. 40: 10.

*Acronicta edolatina*: Chen, 1992, Ins. Hengduan Mts. p. 988.

翅展 45mm。头、胸、腹及前翅灰色带暗褐色，颈板和前胸有黑纹，前翅基线、内线及外线均双线黑色，亚中褶一黑纵条达内线，1脉基部及翅后缘基部亦有黑纵条，环纹不显，肾纹隐约可见一曲纹，1脉前缘在内、外线间有一黑纵条，外区各翅脉间有黑纵纹；后翅白色，隐约可见外线；腹部灰色带褐。

**分布** 陕西、云南。

### 华剑纹夜蛾 *Acronicta auricoma* (Denis et Schiffermüller) (图版 III-11)

*Noctua auricoma* [Denis et Schiffermüller], 1775, Schmett. Wien. p. 67. (奥地利)

*Acronycta auricoma*: Hampson, 1909, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 8: 132.

*Acronicta auricoma*: Chen, 1985, Econ. Ins. Fn. China, Lep. Noet. 4: 16, pl. 2, fig. 19.

翅展 31mm。头部白色杂黑色及褐色；前、中胸有黄白色；前翅黄白，密布细黑点，各横线黑色，基、内、外线均双线，环、肾纹黑边，后者后半几全黑，中线粗；后翅白色，顶角与端区带褐色。雄蛾抱器腹延伸，抱钩斜达瓣端，阳茎短，有细小角状器(图 46)。

**寄主** 桦、栎、悬钩子等属。

**分布** 黑龙江、河北；俄罗斯，欧洲。

### 尘剑纹夜蛾 *Acronicta pulverosa* (Hampson) (图版 III-12)

*Acronycta pulverosa* Hampson, 1909, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 8: 133, pl. 126, fig. 9. (日本)

*Acronycta pulverosa*: Draudt, 1931, in Seitz, Macrolep. World, 3 Suppl. p. 11. pl. 1h.