

Acronycta fixseni Graeser, (1889) 1888, Berl. ent. Zeit. 32: 311.

Acronycta rephaelis Hampson, 1909, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 8: 147.

Acronicta cubitata Warren, 1914, Nov. zool. 21. 402.

Acronycta raphael: Draudt, 1931, in Seitz, Macrolep. World 3 Suppl. p. 12.

Acronicta raphael: Warren, 1909, in Seitz, Macrolep. World 3: 16, pl. 3e. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 244, pl. 77, fig. 1766.

翅展 32mm。头、胸灰色带棕色，翅基片内外缘黑色；前翅灰棕色，基线、内线、外线均双线黑色，剑纹黑色，环纹灰色，肾纹暗棕色，中线黑色，前段呈斑状，亚端线灰白色，外侧一系列黑点；后翅褐棕色，外线可见；腹部浅褐色。

分布 黑龙江；俄罗斯。

戟剑纹夜蛾 *Acronicta euphorbiae* (Denis et Schiffermüller) (图版 III-17)

Noctua euphorbiae [Denis et Schiffermüller], 1775, Schmett. Wien. p. 67. (奥地利)

Acronycta euphorbiae: Hampson, 1909, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 8: 158.

Acronicta euphorbiae: Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 244, pl. 77, fig. 1769.

Chamaepora euphorbiae: Warren, 1909, in Seitz, Macrolep. World 3: 17, pl. 3g.

翅展 32—36mm。头、胸、前翅灰白色杂黑色，前翅基线、内线、外线均双线黑色，中线黑色，亚端线灰白色，锯齿形，环、肾纹轮廓不清，后者中央褐色，缘毛黑白相间；后翅白色微带褐色，翅脉纹褐色，隐约可见外线，缘毛白色；腹部褐灰色。

寄主 杨梅、桦、欧石南等属。

分布 黑龙江、新疆、河北、山西、西藏；土耳其，欧洲。

浊剑纹夜蛾 *Acronicta regifica* Draudt (图版 III-18)

Acronicta (*Hyboma*) *regifica* Draudt, 1937, Ent. Rdsch. 54: 383, pl. 4, fig. 2b. (云南丽江)

Acronicta regifica: Draudt, 1950, Mitt. munch. ent. Ges. 40: 8. —Chen *et al.*, 1991, Noct. Fn. Xizang p.45.

翅展 45mm。头部灰黑色杂白色；胸部灰褐色杂白色；前翅褐色杂白色，基线、内线均双线黑色，基线、内线间在亚中褶前灰白色杂褐色，中线黑带状，不清晰，外线黑色模糊，亚端线灰白衬褐，环纹小，灰白色，肾纹褐色，前缘脉端部有一列白点；后翅灰白色，前、外缘褐灰色；腹部灰褐杂白色。

分布 云南、西藏。

首剑纹夜蛾 *Acronicta megacephala* (Denis et Schiffermüller) (图版 III-19)

Noctua megacephala [Denis et Schiffermüller], 1775, Schmett. Wien. p. 67. (奥地利)