

34. 环纹小	戟剑纹夜蛾 <i>A. euphoriae</i>
环纹中常	35
35. 前翅密布细黑点	36
前翅散布细黑点	37
36. 前翅亚中褶基部一白纹	独剑纹夜蛾 <i>A. regifica</i>
前翅亚中褶无白纹	首剑纹夜蛾 <i>A. megacephala</i>
37. 前翅窄长	40
前翅非窄长	38
38. 前翅外线外方有一列放射形黑纹	辐剑纹夜蛾 <i>A. radiata</i>
前翅外线外方无放射形黑纹	天剑纹夜蛾 <i>A. tienae</i>
39. 基剑纹粗	桃剑纹夜蛾 <i>A. intermedia</i>
基剑纹细	晃剑纹夜蛾 <i>A. leucocuspis</i>
40. 后翅白色	长剑纹夜蛾 <i>A. longatella</i>
后翅灰褐色	合剑纹夜蛾 <i>A. insitiva</i>

涵剑纹夜蛾 *Acronicta hemileuca* (Püngeler) (图版 II-16)

Acronycta hemileuca Püngeler, (1900) 1899, Iris, 12: 291, pl. 8, fig. 6. (青海湖)

Acronycta hemileuca: Hampson, 1909, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 8: 64, pl. 124, fig. 11—Draudt, 1931, in Seitz, Macrolep. World, 3 Suppl. p. 8, pl. 1b.

Acronicta hemileuca: Warren, 1909, in Seitz, Macrolep. World 3: 14, pl. 2k.—Chen, 1985, Econ. Ins. Fn. China, Lep. Noct. 4: 19.

翅展 30mm。头、胸灰色杂黑色；前翅褐灰，密布黑点，亚中褶基部一黑纵纹，各横线黑色，环、肾纹褐黄色，两纹间有三角形黑纹一黑纵纹在亚中褶处穿过外线；后翅白色；腹部褐色。

分布 山西、陕西、青海。

承剑纹夜蛾 *Acronicta succedens* Draudt (图版 II-17)

Acronicta succedens Draudt, 1937, Ent. Rdsch. 54: 382, pl. 4, fig. 3b. (云南丽江)

Acronycta succedens: Draudt, 1950, Mitt. munch. ent. Ges. 40: 8.

Acronicta succedens: Chen, 1992, in Peng, Icon. For. Ins. Hunan, p. 954.

翅展 30—32mm。头、胸、前翅褐灰色微带紫色，前翅内线、亚端线黑褐色，亚中褶一黑褐纵纹伸至近中区，中室外侧暗褐色，端区的中褶处有一黑褐纵纹；后翅褐色；腹部暗褐色。

分布 湖南、云南。

拙剑纹夜蛾 *Acronicta jozana* (Matsumura) (图版 II-18)

Acronycta jozana Matsumura, 1926, Ins. mats. 1: 1, pl. 1, fig. 5. (日本)

Hyboma jozana: Sugi, 1982, in Inoue et al., Moths Jap. 1: 675, pl. 165, fig. 5.

Acronicta jozana: Chen, 1985, Econ. Ins. Fn. China, Lep. Noct. 4: 17.

翅展 30mm。头、胸灰色杂白色；前翅灰白色密布黑点，亚中褶基部有一黑纵纹，基线、内线及外线均双线黑色，环、肾纹白色黑边，后者中央有黑纹，外线中段外弯明显；后翅浅褐色，端区色暗；腹部褐色。

分布 黑龙江、河北；日本。

光剑纹夜蛾 *Acronicta adaucta* Warren (图版 II-19)

Acronicta strigosa ssp. *adaucta* Warren, 1909, in Seitz, Macrolep. World 3: 16, pl. 3e. (日本)

Acronycta phaedra Hampson, 1910, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 8: 520, pl. 147, fig. 32.

Hyboma adaucta: Sugi, 1982, in Inoue, Moths Jap. 1: 675, pl. 165, figs. 20—22.

翅展 33mm。头、胸灰褐色；前翅褐灰色，密布黑细点，后缘基部一扁白斑，基线、内线及外线均双线黑色，基剑纹黑点，在1脉处稍扩展，前方沿中脉有二白点，中剑纹黑色，亚端线灰白，端剑纹黑色达外缘，环、肾纹白色黑边，中央有黑点纹；后翅污白色；腹部污灰色。

分布 江西；日本。

果剑纹夜蛾 *Acronicta strigosa* (Denis et Schiffermüller) (图版 II-20)

Noctua strigosa [Denis et Schiffermüller], 1775, Schmett. Wien. p. 88. (奥地利)

Acronicta strigosa: Warren, 1909, in Seitz, Macrolep. World 3: 16, pl. 3e. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 242, pl. 77, fig. 1754.

Hyboma strigosa: Sugi, 1982, in Inoue et al., Moths Jap. 1: 675.




图 31 果剑纹夜蛾 *Acronicta strigosa* (Denis et Schiffermüller) ♂ 外生殖器