

分布 河北、江苏；日本。

黑剑纹夜蛾 *Acronicta nigricans* (Leech) (图版Ⅲ-14)

Acronycta nigricans Leech, 1900, Trans. ent. Soc. Lond. p. 104. (中国西部: Wa-shan)

Acronycta nigricans: Hampson, 1909, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 8: 140, pl. 126, fig. 18.

Acronicta nigricans: Warren, 1909, in Seitz, Macrolep. World 3: 15, pl. 75g.

翅展 40mm。头、胸黑褐色；前翅灰褐色，有黑细点，后缘区及端区黑点甚密，基线、内线、外线均双线黑色，亚端线稍白，基剑纹黑色，环、肾纹黑边，后者中有黑曲纹，中线黑色，外线两线间在后缘区呈白色新月形；后翅白色，端区翅脉纹暗褐色，顶角区微褐；腹部赭白色带黄褐。

分布 西藏、中国西部。

丝剑纹夜蛾 *Acronicta metaxantha* (Hampson) (图版Ⅲ-13)

Acronycta metaxantha Hampson, 1909, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 8: 139, pl. 126, fig. 17.

(中国西部: Chia-kou-ho)

Acronicta metaxantha: Chen, 1985, Econ. Ins. Fn. China, Lep. Noct. 4: 17.

翅展 37mm。头、胸黑褐色杂灰白；前翅暗褐灰色，基线、内线、外线均双线黑色，后者锯齿形，亚端线白色大波浪形，环、肾纹灰白色，中有黑或褐色点纹，环纹、肾纹之间色浅，外线双线间在亚中褶处明显白色；后翅杏黄色，端区有一黑色宽带，在亚中褶处成一内突齿，臀角处缘毛杏黄色；腹部褐色。

分布 河北、山西、陕西、湖北、湖南、四川。

威剑纹夜蛾 *Acronicta digna* (Butler) (图版Ⅲ-15)

Thalpophila digna Butler, 1881, Trans. ent. Soc. Lond. p. 176. (日本)

Acronycta digna: Hampson, 1909, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 8: 146.

Acronicta digna: Warren, 1909, in Seitz, Macrolep. World 3: 14, pl. 2i. Chen, 1982, Icon. Het, Sin. 3: 242, pl. 77, fig. 1758.

Viminia digna: Sugi, 1982, in Inoue et al., Moths Jap. 1: 679.

翅展 38—40mm。头、胸深灰色杂黑色；前翅棕褐色，基部、中室中部及外线内侧色浅，基线、内线、外线均双线黑色，后者线间白色，环纹灰白色，中央一黑点，肾纹黑褐色，内缘微白，中线带状，不清晰，亚端线白色；后翅浅黄色，外线褐色，端区有一褐带；腹部浅黄褐色。

分布 黑龙江、河南、湖北、湖南；日本，朝鲜，俄罗斯。

苏剑纹夜蛾 *Acronicta raphael* (Oberthür) (图版Ⅲ-16)

Acronycta raphael Oberthür, 1884, Et. ent. 10: 19, pl. 2, fig. 9. (SE Siberia: Sidemi)