

肾纹前有一黑条伸至前缘脉，外线中段有一新月形白纹，亚端线白色；后翅棕黄色，腹部褐灰色。雄蛾抱钩细长，斜伸，稍超出瓣背缘，端尖而稍弯（图 36）。




图 36 梨剑纹夜蛾 *Acronicta rumicis* (Linnaeus) ♂ 外生殖器

寄主 梨、桃、苹果、山楂、梅、柳等。

分布 新疆、江苏、浙江、湖北、湖南、福建、四川、贵州、云南；欧洲。

辐剑纹夜蛾 *Acronicta radiata* (Warren) (图版 II-26)

Chamaepora radiata Warren, 1909, in Seitz, Macrolep. World 3: 17, pl. 3i. (阿富汗)

翅展 34mm。头、胸浅褐色杂黑色；前翅浅褐灰色，密布黑点，内线与外线均双线黑色，外线的外一线锯齿形，在翅脉上形成明显尖齿，外线与亚端线间约成暗带状，环、肾纹不明显，可见黑边，两纹间有一黑线达前缘脉；后翅白色带褐，顶角与臀角带黑色；腹部浅褐色。

分布 新疆；阿富汗。

小剑纹夜蛾 *Acronicta omorii* Matsumura (图版 II-30)

Acronycta omorii Matsumura, 1926, Ins. Mats. 1: 3, pl. 1, fig. 2. (日本)

Acronicta omorii: Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 245, pl. 77, fig. 1772.

Molybdonycta omorii: Sugi, 1982, in Inoue et al., Moths Jap. 1: 675.

翅展 33mm。头、胸及前翅褐灰色，前翅基部一黑纹，剑纹黑色，内线双线黑色，环、肾纹褐灰色有白环及黑边，两纹之间黑色，环纹前端一黑线沿亚前缘脉伸至内线，中线斜，外线黑色，在 3、4 脉处微成尖齿突，亚中褶有一黑色端剑纹，亚端线隐约可见；后翅白色，端区微带褐色。

分布 河北；日本。