

Viminia lutea: Sugi, 1982, in Inoue *et al.*, Moths Jap. 1: 679.

翅展 36mm。头、胸灰白杂黑褐色；前翅黄白色，大部带黑褐，基线、内线、外线均双线黑色，环、肾纹黑边，亚端线黄白色；后翅黄色，端带宽，黑褐色；腹部灰色带褐，基部黄色。雄蛾抱钩二叉，背一支长而斜行，阳茎有一角状器（图 35）。

寄主 低矮草本植物。

分布 黑龙江、河北、湖北；日本，朝鲜。

谐剑纹夜蛾 *Acronicta cavillatrix* Draudt (图版 II-27)

Acronicta (*Hyboma*) *cavillatrix* Draudt, 1937, Ent. Rdsch. 54: 383, pl. 4, fig. 2d. (天目山)

Acronicta cavillatrix: Draudt, 1950, Mitt. munch. ent. Ges. 40: 8. —Poole, 1989, Lepid. Cat. p. 23.

翅展 43mm。头、胸及前翅灰白色杂褐及黑色，前翅基线、内线及外线均双线黑色，亚端线白色，环纹白色，斜圆，肾纹仅可见黑褐边及白点，外区前缘、中段及亚中褶处各有一黑晕散斑纹；后翅浅褐黄色，端区有一暗褐宽带，其内侧一褐线；腹部污褐色。

分布 浙江。

尖剑纹夜蛾 *Acronicta cuspis* (Hübner) (图版 II-28)

Noctua cuspis Hübner, 1813, Samml. eur. Schmett., pl. 108, fig. 504. (欧洲)

Acronycta cuspis: Hampson, 1909, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 8: 110.

Acronicta cuspis: Warren, 1909, in Seitz, Macrolep. World 3: 14, pl. 2h.

Triaena cuspis: Sugi, 1982, in Inoue *et al.*, Moths Jap. 1: 677.

翅展 40—50mm。头、胸、腹及前翅白色杂少许褐色，颈板与翅基片有黑褐纹，前翅基线、内线、外线均双线黑色，亚端线隐约可见，剑纹黑色，有一分支，环纹斜圆，肾纹内缘黑色，两纹有一黑纹相连，外线在中褶处有黑纵纹穿过，在亚中褶另一浓黑纹穿越；后翅白色微带褐，可见褐色外线，雌蛾后翅色暗。

寄主 桉木属。

分布 黑龙江、新疆；中亚地区，日本，欧洲。

梨剑纹夜蛾 *Acronicta rumicis* (Linnaeus) (图版 II-29)

Phalaena Noctua rumicis Linnaeus, 1758, Syst. Nat. Edn. 10: 516. (欧洲)

Acronicta rumicis: Leech, 1889, Trans. ent. Soc. p. 129. —Chen, 1982, Icon. He Icon. Het. Sin. 3: 242, pl. 77, fig. 1757.

翅展 32—46mm。头、胸棕灰杂黑白色；前翅暗棕间白色，内、外线均双线黑色，

肾纹前有一黑条伸至前缘脉，外线中段有一新月形白纹，亚端线白色；后翅棕黄色，腹部褐灰色。雄蛾抱钩细长，斜伸，稍超出瓣背缘，端尖而稍弯（图 36）。




图 36 梨剑纹夜蛾 *Acronicta rumicis* (Linnaeus) ♂ 外生殖器

寄主 梨、桃、苹果、山楂、梅、柳等。

分布 新疆、江苏、浙江、湖北、湖南、福建、四川、贵州、云南；欧洲。

辐剑纹夜蛾 *Acronicta radiata* (Warren) (图版 II-26)

Chamaepora radiata Warren, 1909, in Seitz, Macrolep. World 3: 17, pl. 3i. (阿富汗)

翅展 34mm。头、胸浅褐色杂黑色；前翅浅褐灰色，密布黑点，内线与外线均双线黑色，外线的外一线锯齿形，在翅脉上形成明显尖齿，外线与亚端线间约成暗带状，环、肾纹不明显，可见黑边，两纹间有一黑线达前缘脉；后翅白色带褐，顶角与臀角带黑色；腹部浅褐色。

分布 新疆；阿富汗。

小剑纹夜蛾 *Acronicta omorii* Matsumura (图版 II-30)

Acronycta omorii Matsumura, 1926, Ins. Mats. 1: 3, pl. 1, fig. 2. (日本)

Acronicta omorii: Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 245, pl. 77, fig. 1772.

Molybdonycta omorii: Sugi, 1982, in Inoue et al., Moths Jap. 1: 675.

翅展 33mm。头、胸及前翅褐灰色，前翅基部一黑纹，剑纹黑色，内线双线黑色，环、肾纹褐灰色有白环及黑边，两纹之间黑色，环纹前端一黑线沿亚前缘脉伸至内线，中线斜，外线黑色，在 3、4 脉处微成尖齿突，亚中褶有一黑色端剑纹，亚端线隐约可见；后翅白色，端区微带褐色。

分布 河北；日本。