

Hyboma jozana: Sugi, 1982, in Inoue *et al.*, Moths Jap. 1: 675, pl. 165, fig. 5.

Acronicta jozana: Chen, 1985, Econ. Ins. Fn. China, Lep. Noct. 4: 17.

翅展 30mm。头、胸灰色杂白色；前翅灰白色密布黑点，亚中褶基部有一黑纵纹，基线、内线及外线均双线黑色，环、肾纹白色黑边，后者中央有黑纹，外线中段外弯明显；后翅浅褐色，端区色暗；腹部褐色。

分布 黑龙江、河北；日本。

光剑纹夜蛾 *Acronicta adauca* Warren (图版 II-19)

Acronicta strigosa ssp. *adauca* Warren, 1909, in Seitz, Macrolep. World 3: 16, pl. 3e. (日本)

Acronycta phaedra Hampson, 1910, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 8: 520, pl. 147, fig. 32.

Hyboma adauca: Sugi, 1982, in Inoue, Moths Jap. 1: 675, pl. 165, figs. 20—22.

翅展 33mm。头、胸灰褐色；前翅褐灰色，密布黑细点，后缘基部一扁白斑，基线、内线及外线均双线黑色，基剑纹黑点，在 1 脉处稍扩展，前方沿中脉有二白点，中剑纹黑色，亚端线灰白，端剑纹黑色达外缘，环、肾纹白色黑边，中央有黑点纹；后翅污白色；腹部污灰色。

分布 江西；日本。

果剑纹夜蛾 *Acronicta strigosa* (Denis et Schiffermüller) (图版 II-20)

Noctua strigosa [Denis et Schiffermüller], 1775, Schmett. Wien. p. 88. (奥地利)

Acronicta strigosa: Warren, 1909, in Seitz, Macrolep. World 3: 16, pl. 3e. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 242, pl. 77, fig. 1754.

Hyboma strigosa: Sugi, 1982, in Inoue *et al.*, Moths Jap. 1: 675.




图 31 果剑纹夜蛾 *Acronicta strigosa* (Denis et Schiffermüller) ♂ 外生殖器

翅展 34mm。头、胸暗灰色；前翅灰色带黑，基、中、端剑纹均黑色明显，各横线黑色，环纹灰色，肾纹灰白色，端剑纹端部有二白点；后翅浅褐色；腹部灰色带褐。雄蛾抱钩二叉，腹一支长，阳茎有棘形角状器（图 31）。

寄主 山楂、桃、苹果。

分布 黑龙江、内蒙古、河南、福建、四川、云南；日本，朝鲜，欧洲。

童剑纹夜蛾 *Acronicta bellula* (Alpheraky) (图版 II-21)

Acronycta bellula Alpheraky, 1895, Iris, 8: 189. (Sidemi)

Acronicta bellula: Warren, 1909, in Seitz, Macrolep. World 3: 13

Apatele cerasi Howarth, 1951, Proc. Trans. Soc. Lond. ent. Nat. Hist. Soc. 1949—1950: 104, pl. 15, fig.

Acronicta cerasi: Chen, 1985, Econ. Ins. Fn. China, Lep. Noct. 4: 18, pl. 1, fig. 17.




图 32 童剑纹夜蛾 *Acronicta bellula* Alpheraky ♂ 外生殖器

翅展 32mm。头部灰白色；胸部灰色带黑褐；前翅灰色，亚中褶基部及外区各一黑纵纹，各横线黑色，环、肾纹灰白色黑边；后翅白色；腹部浅褐色。雄蛾抱钩短粗，阳茎有一簇钉形角状器（图 32）。

分布 黑龙江、河北；朝鲜，俄罗斯。

复剑纹夜蛾 *Acronicta geminata* (Draudt) (图版 II-22)

Acronycta geminata Draudt, 1950, Mitt. munch. ent. Ges. 40: 8, pl. 1, fig. 9, pl. 11, fig. 5 male genitalia. (四川巴塘)