

合剑纹夜蛾 *Acronicta insitiva* Draudt (图版Ⅲ-21)

Acronicta insitiva Draudt, 1937, Ent. Rdsch. 54: 399, pl. 4, fig. 3g (云南丽江)

翅展 44mm。头、胸与前翅黑灰色，后者有紫色调，基线双线黑色，仅前段可见，内线与外线均双线黑色，后者双线间灰白色，亚端线灰白色，不明显，基剑纹为一黑纵线，达内线，其前缘有一长度相当的白纵条，环纹扁圆形，灰色白边，中线黑色，在中室下角处折角，翅外缘灰黑色；后翅灰褐色，端区色暗，缘毛黄白色；腹部灰褐色。

分布 云南。

天剑纹夜蛾 *Acronicta tiena* (Püngeler) (图版Ⅲ-22)

Acronycta tiena Püngeler, 1907, D. ent. Z. Iris, 19: 216, pl. 8, fig. 10. (Alexander Mountains; Ili Region)

Acronycta tiena: Hampson, 1909, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 8: 150, pl. 126, fig. 29. — Draudt, 1931, in Seitz, Macrolep. World 3 Suppl. p. 12, pl. 1i. — Draudt, 1950, Mitt. munch. ent. Ges. 40: 10.

Acronicta tiena: Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 244, pl. 77, fig. 1768. — Poole, 1989, Lepid. Cat. p. 30.

翅展 38mm。头、胸及前翅白色，后者密布细黑点，基线、内线及外线均双线黑色，基线、内线波浪形，外线锯齿形，环纹为一黑环，肾纹黑边，中有黑曲纹，环纹前有一黑条，中线黑色，锯齿形，亚端线白色，波浪形；后翅白色带褐，可见横脉纹、外线及亚端线；腹部褐黄色。

分布 青海、新疆、河北、四川、云南。

刀夜蛾属 *Simyra* Ochsenheimer

Simyra Ochsenheimer, 1816, Schmett. Eur. 4: 81

Type-species: *Noctua nervosa* [Denis et Schiffermüller].

Cnephata Billberg, 1820, Enum. Ins. Mus. Bllbg. p. 85.

Asema Sodoffsky, 1837, Bull. Soc. Nat. Mosc. 10 (6): 87.

Arsilonche Lederer, 1857, Noct. Eur. p. 70.

Ablepharon Grote, 1873, Bull. Buff. Soc. nat. Sci. 1: 111.

Ommatostolidea Benjamin, 1933, Pan-Pacific Ent. 9: 1.

喙不发达，下唇须向前伸，下缘饰毛，额平滑，复眼稍小，雄蛾触角双栉形；胸部只有毛，无毛簇，足胫节饰长毛；腹部背面无毛簇；前翅有副室。雄蛾抱器瓣短宽，抱钩位置偏向瓣端部。