

### 间纹炫夜蛾 *Actinotia intermediata* (Bremer) (图版XXXIV-19)

*Cloantha intermediata* Bremer, 1861, Bull. Acad. Imp. Sci. St-Petersb. 3: 489. (Kengka-see)

*Delta intermedia*: Hampson, 1909, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 8: 192. —Holloway, 1976, Moths Borneo, p. 13.

*Lepidodelta intermedia*: Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 246.

*Actinotia intermediata*: Sugi, 1982, in Inoue et al., Moths Jap. 1: 760.

翅展 35 mm。头、胸及前翅灰白带浅褐色，翅脉黑色，前、后缘及中室前半带紫褐色，肾纹后方及 2—5 脉基部紫棕色，剑纹细长，环纹长扁，肾纹大，1 脉后有一褐线，肾纹外有一尖白齿，一黑纹自顶角至肾纹，臀角前一黑纹；后翅浅褐灰色，端区黑棕色；腹部灰褐色。雄蛾抱器内突分叉，腹一支端部二齿形（图 511）。




图 511 间纹炫夜蛾 *Actinotia intermediata* (Bremer) ♂ 外生殖器

**分布** 黑龙江、陕西、湖北、湖南、浙江、福建、海南、四川、云南；日本，朝鲜，印度，斯里兰卡。

### 回夜蛾属 *Hyppa* Duponchel

*Hyppa* Duponchel, [1845] 1844, Cat. Meth. Lep. Eur. p. 172.

Type-species: *Phalaena rectilinea* Esper.

喙发达，下唇须斜向上伸，第二节达额中部，下缘饰毛，第三节小，额无突起，头顶在两触角间有毛簇，复眼大，圆形，雄蛾触角短单栉形，各栉齿端部膨大，胸部被毛状鳞，前、后胸有散开的毛簇，腹部背面有一列毛簇，第三、四节毛簇较大，前翅有副室，后翅 6、7 脉共柄。